

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十二 明 周王朱橚 撰

喘嗽門

咳嗽上氣唾膿血

夫咳嗽唾膿血者損肺傷心之故也肺主氣心主血肺感于寒微者則成咳嗽傷于陽脉則有血血于氣相隨而行咳嗽極甚傷血動氣俱乘于肺以津液相搏蘊結成膿故咳嗽而有膿也 久咳嗽上氣者是肺氣虛極

風邪停滯故其病積月累年久不瘥則胃背痛面腫甚則唾膿血久咳嗽唾膿血者肺感于寒微則成咳嗽極甚傷于經絡血液蘊結故有膿血氣血俱傷故連滯積久其血黯瘀與膿血相雜而出也

方

款冬花丸 治三十年上氣咳嗽唾膿血喘急不得卧

款冬花 紫苑 細辛 石斛 防風 芎藭

人參 當歸 藁本 甘草 蜀椒 白朮 半

夏天雄 菖蒲 鍾乳 桂心 麻黃各三兩 獨

活二兩烏頭 芫花 附子各一兩 桃仁二十枚 大棗十五枚

枚

右為末蜜丸如梧桐子大每服二十九丸酒下日二不知加之酒漬服亦得

款冬花丸 治積年咳嗽唾膿血喘急不得卧

款冬花 石斛去根 紫菀去苗 細辛去苗 防風去義 芎

藭 人參 當歸切 藁本去苗 甘草炙 蜀椒去目並閉

欽定四庫全書

普濟方  
卷一百六十二

三

口炒白朮剉

天雄炮裂去

菖蒲

切各

桂

去粗皮

麻

黃

去根節湯浸煮

半夏

湯洗七遍去滑焙

獨活

去

蘆

頭剉芫花

醋浸

鍾乳粉

研

桃仁

湯浸去皮尖雙

仁研各二兩

右為末和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九煎

桑白皮湯下日三夜一

補肺湯 療咳逆上氣吐膿或吐血胃膈滿痛不能食

黃耆

一法

桂心

乾地黄

茯苓

厚朴

乾薑

紫苑

橘皮

當歸

五味子

遠志

去

麥門冬

去心各  
三兩

甘草

炙

鍾乳

白石英

各二兩

桑根白皮

人參

各三兩

大棗

二十枚擘

右切以水一斗四升煮取四升分四服日三夜一忌

海藻松菜生葱酸物

款冬花凡 治三十年上氣咳嗽唾膿血喘急不得卧

款冬花 乾薑 蜀椒 吳茱萸 桂心 菖蒲

各五人參 細辛 芫花 紫菀 甘草 桔梗

防風 茯苓

皂莢

各三分

右為末蜜和丸如梧桐子大每服三丸酒下每日三

服

羊肺湯 療咳嗽晝夜無間息氣欲絕傷肺唾血

鍾乳

五兩

牡蠣

煨

桂心

各六兩

射干

桃仁

去皮尖

貝母

橘皮

百部根

五味子

各三兩

生薑

六兩

白石英

半夏

洗各三兩

款冬花

甘草

炙

厚朴

炙各一兩

羊肺

具一

右切以水二斗三升煮羊肺取一斗去肺內諸藥煮

取三升分四服日三夜一忌海藻松菜羊肉錫生葱

貝母散

出聖惠方

治久咳嗽晝夜不息氣奔欲絕傷肺唾

膿血宜服之

貝母

三分煨微黃

桂心

一兩

射干

半兩

鍾乳粉

一兩

桃仁

三分

浸去

皮尖雙仁炒

陳橘皮

半兩浸去白穢

百部

半兩

五味子

一兩

白石英

二兩細研

半夏

三分湯洗去滑

款冬花

三分

甘草

半兩炙微赤剉

厚朴

半兩

去皮塗薑汁炒令黃

杏仁

一兩湯浸去皮尖雙仁炒

羊肺

一具以水三碗煮取汁一碗

半

右為散每服五錢用羊肺汁一大盞煎至五分去滓



不計時候溫服

款冬花丸

出聖惠方

治咳嗽氣逆眠睡不安唾膿血喘急連

年不瘥

款冬花

一兩

杏仁

雙仁炒研如膏

紫苑

一兩去苗土

蛤

蚘

一對頭尾全者酥慢火炙黃

栢葉

三分

白石英

一兩半細研水飛

人參

甘草

三分炙剉

五味子

三分

白茯苓

一兩

天門冬

一兩半去心焙

桂心

三分

熟地黄

二兩

乾薑

半兩炮

鹿角膠

三兩

炒黃燥

碎

右為末煉蜜和丸擣三二百杵丸如梧桐子大每服

三十丸以粥飲送下不拘時

葶藶散

出聖惠方

治肺壅咳嗽唾膿血不得睡卧

甜葶藶

二兩半隔紙炒令紫色

右為末每服二錢水一盞煎至六分不拘時候溫服

又療傷肺唾血

右用茅根為散每服方寸日三亦可絞取汁飲之主

熱渴

治一切肺疾咳嗽膿血不止

出肘後方

右用猪臟一具削薄竹筒盛于塘火中炮令極熱食上喫之一方以黃酒煮食令盡不過二服

款冬花散 刪繁療肺偏損胃中應肺偏痛唾血氣短

款冬花 當歸各六兩 桂心 芎藭 五味子 附

子炮各七分 細辛 貝母各四分 乾薑 乾地黃 白朮

甘草炙 杏仁去皮尖 紫菀三分

右為散清酒服方寸日二服忌生葱菜桃李雀肉海

藻菰菜猪肉蕪荑

黃耆散

出聖惠方

治咳嗽唾膿血胃滿痛不得能食

黃耆

一兩到

桂心

熟地黄

赤茯苓

紫苑

去苗土

陳皮

湯浸去白穰

當歸

五味子

麥門冬

去心甘草

炙赤

剉白朮

人參

去蘆各一兩

桑白皮

一兩半

鹿角膠

二兩搗碎

炒黃燥

右為散每服四錢水一中盞入棗三枚煎至六分去

滓溫服不拘時

茜根散

出聖惠方

治久咳嗽不瘥氣喘欲絕肺唾膿血

茜根

分三百兩

桑白皮

一對

款冬花

分三貝母半兩

紫蘇葉

一兩

阿膠

一兩

麥門冬

一兩

川升麻

熟地黄

一兩

黃芩

一兩

甘草

半兩

赤剉

杏仁

分

右為散每服四錢水一中盞入竹茹一分煎至六分

去滓不拘時溫服

款冬花丸

出千金方

治三十年上氣咳嗽唾膿血喘急不

得卧

款冬花 乾薑 桂心 紫苑各三分 細辛二分 杏仁

皂莢 礬石一作礬石 菖蒲 烏頭各一分 蜀椒五合 吳茱

萸六合

右為末蜜和丸如梧桐子大酒服五丸日三夜二治  
二十年嗽不過五十日患愈咳嗽喉鳴上氣服一劑  
永瘥

白膠湯

出千金方

治肺傷咳唾膿血胸滿上氣不能食惡

風目暗眦足脛寒冷

白膠

生薑

各五兩

桂心

人參

紫苑

各二兩

大棗

二十枚

乾地黄

切半斤

桑白皮

切二升

芎藭

大麻仁

飴糖

各一升

大麥

三升

右咬咀水一斗五升煮麥下藥煮取三升分作五服

桑白皮煎

療咳經年不瘥氣喘欲絕傷肺見血

桑白皮

切五合

白羊肺

一具切

芍藥

十分

款冬花

六分

茯苓

十二分

貝母

十二分

麥門冬

六分

杏仁

六分去皮尖熬為膏

升麻

十二分

分

生地黃

汁一分

黃芩

十二分

蜜

一分

右切以水一斗煮取三升去滓內杏仁脂地黃汁蜜等微火上煎如魚眼沸攪勿停手取二升二合煎成淨綿夾布濾每服食後含一合日夜三四度老小以意減之微含之佳忌生冷油醋麪魚蒜蕪荑

團參飲子

出濟生方

治病因抑鬱憂思喜怒飢飽失宜致

臟氣不平咳嗽膿血漸成肺痿憎寒壯熱羸瘦困頓將成癆瘵

人參 紫菀茸

阿膠

蛤粉炒

百合

蒸

細辛

洗去苗土

款



冬花 杏仁

去皮尖炒

天門冬

湯浸去心

半夏

湯浸七次

經霜桑

葉 五味子

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五大片煎至七分去滓食後溫服因氣而嗽者宜加木香咳而唾血有熱者加生地黃咳而唾血有寒者加鍾乳粉因痰極而咳者加黃耆因損咳而唾血者加沒藥藕節咳而嘔逆腹滿不食者加白朮仍倍加生薑咳而小便多者加益智仁咳而大便湧者去杏仁加鍾乳粉咳而

面浮氣逆者加沉香柑皮煎

地黃散

出聖惠方

治久咳嗽唾膿血四肢瘦弱

熟地黃

兩一分

茜根

三分

白芍藥

三分

甘草

半兩炙赤剉

栢葉

三分

白茯苓

三分

當歸

半兩

杏仁

三分浸去皮尖雙仁炒黃

子芩

半兩

鹿角

膠

一兩搗碎炒令燥

羚羊角屑

半兩

貝母

半兩煨微黃

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不拘時溫服

欬冬花丸

療咳逆氣喘不息不得眠唾血嘔血短氣

連年

欵冬花

十二分

杏仁

八分去皮尖  
雙仁煮熱

香豉

十八分熱

人參

二分

甘草

三分 蜀椒

三分炒  
出汗

天門冬

六分  
去心

乾薑

桂心

乾地黄

各三分

右檮節蜜和丸如彈子含稍稍嚥汁日四夜三神良

忌海藻松菜生葱蕪荑鯉魚

紫菀湯

治咳嗽吐膿血胸膈滿痞不思食

紫菀

去苗  
土

欵冬花

去  
梗杏仁

去皮尖雙仁  
炒令黃色

生乾地黄

麻黃

去根節

甘草

炙剉

秦艽

去苗土

桑根白皮

炙剉

黃明膠

炒

馬兜鈴

糯米

右各等分麤擣篩每服五錢水一盞半入棗三枚擘

碎同煎至八分去滓食後溫服

杏仁湯 治肺氣壅熱咳嗽上氣或唾膿血

杏仁

去皮尖雙仁炒黃色

桑根白皮

炙剉

訖胡

去苗各三分

甘草

炙剉

麻黃

去根節

桔梗

去蘆頭

款冬花

去梗

紫苑

去苗土

茜根

剉

半夏

湯浸去滑生薑汁製焙

右各等分麤擣篩每服五錢水一盞半生薑三片煎

至八分去滓溫服

補肺白石英散

出聖惠方

治久咳嗽唾膿血胸滿不能飲

食卧則短氣

白石英

一兩細碎研

款冬花

三分桂心兩半

鍾乳粉

一兩乾薑

一分炮裂剉

麥門冬

一兩去心

五味子

一兩

赤茯苓

一兩甘草兩半

炙微赤剉

桑白皮

一兩剉

熟地黄

一兩半

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗二枚煎

至六分去滓不拘時溫服

蛤蚧湯 治咳嗽唾膿血及肺痿羸瘦涎涕稠粘

蛤蚧

酒浸酥炙

知母

焙

貝母

炮

鹿角膠

炙令燥

甘草

炙

劉杏

仁湯

浸去皮尖雙仁炒

葛根

劉

桑根白皮

炙

人參

一兩

枇杷葉

去毛炙各一兩

右麤擣篩每服三錢水一盞半煎至八分去滓不拘

時溫服

阿膠煎 治久咳嗽唾膿血

阿膠

二兩搗碎炒令黃燥

薯蕷

一兩微黃

貝母

一兩微黃

白茯苓

一兩

天

門冬

去心一兩半焙

酥

一兩

生地黄汁

升一

生薑汁

一合

白蜜

杏仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃研如膏

右為細末與後五味相和于銀器中以慢火熬令得

所用不津器盛不計時候含半棗大嚥津

鹿角膠散

出聖惠方

治咳嗽唾膿血日夜不止喘息短氣

鹿角膠

搗研炒黃

栢葉

炙令微黃

川椒

去目及閉口者炒汗出

乾薑

炮裂

白蒺藜

微炒去刺

麻黃

去根節

紫苑

去苗土

人參

去蘆頭

刺薊

劉  
芫花

醋拌炒乾  
各半兩

右為散每服一錢水一小盞煎三兩沸不拘時候溫服

紫菀散

海藏濟  
生拔萃

治咳嗽唾中有膿血虛癆症肺痿變

癰

紫菀

人參

知母

貝母

桔梗

甘草

五

味子

茯苓

阿膠

各等分

右為麤末生薑水煎



百部散

出聖惠方

治咳嗽肩髀漸高唾膿血其味腥鹹

百部

一兩枳殼

一兩麩炒去穢

麥門冬

一兩去心

木通

一兩剉

天門

冬

一兩紫苑

一兩去苗土

貝母

一兩煨微黃

赤茯苓

甘草

三分炙剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分竹葉二七

片煎至六分去滓不拘時候溫服

百部丸

出聖惠方

治咳嗽唾膿血

百部

二兩黃芩

一兩桂心

一兩五味子

一兩甘草

一兩炙微赤剉

紫

苑

一兩去苗土

乾薑

一兩炮裂剉

生地黄

兩苗根一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸以粥

飲下不拘時候服

生地黄煎

出聖惠方

治肺臟虛熱咳嗽咽乾痛時唾膿血

生地黄

取自然汁八合

黑錫

三合

白蜜

三合

白沙糖

三合

生薑汁

一合川升麻

三兩為末

鹿角膠

三兩擣碎炒黃

酥

三兩

右件藥都于銀鍋中以慢火煎攪勿住手候稀稠得

所以不津器盛之不計時候含一茶匙嚥津

補肺湯 治咳嗽逆唾膿血咽喉悶塞胸滿上氣不能

飲食卧則短氣

款冬花

三桂去粗皮

鍾乳粉

研

乾薑

炮

白石英

各三兩

麥門冬

去心焙四兩

五味子

炒三兩

桑根白皮

剉半斤

右麤擣篩每服五錢水一盞半入棗二枚擘粳米數十粒煎至一盞去滓溫服日二夜一

桔萎湯 治咳嗽吐血喘滿肺痿

桔萎

一枚取瓤仁蛤粉一匙同炒黃

馬兜鈴

炒

防己

葛根

剉貝

母去心甘草

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒

阿膠

剉入糯米二合同剉炒去米

右麤篩每服三錢水一盞蜜半匙煎至七分去滓溫服日三夜一

五味子湯

出千金方

治咳嗽唾膿血牽胸脇痛

五味子炒

生地黄

焙

桑根白皮

炙剉各一兩

桔梗

紫

菟去苗土續斷

甘草

炙剉

赤小豆

各半兩

右麤擣篩每服三錢入竹茹少許水一盞半煎至八分去滓溫服日三夜一

乾地黄散

出聖慮方

治肺傷咳嗽唾膿血腹中有氣不欲

食惡風目闇足脛酸寒

熟地黄

一兩

白茯苓

三分

芎藭

一兩

鹿角膠

一兩

碎炒

桂心

三分紫苑

三分

人參

一兩

去蘆頭

大麻仁

一兩

兩

兩

右為散每服三錢水一中盞入棗二枚大麥一匙煎

至六分去滓不拘時候溫服

百部丸

出千金方

治諸嗽不得氣息唾膿血

百部根

三兩

升麻

半兩

桂心

五味子

甘草

紫苑

去苗 乾薑 各一  
土 兩

右為末蜜和凡如梧桐子大每服二十凡日三以知為度一方去乾薑有桑根白皮一兩粥飲下

阿膠散 治肺痿嗽血唾血

阿膠 炒酥 二分

人參

茯苓

生乾地黄

天門冬

浸水

去心 北五味子 各一分

白芨 二分

右白芨別為末餘藥剉散每服三錢水一大盞入蜜二匙秫米百粒薑五片同煎臨熟入白芨少許食後

服之

桑白皮湯 治咳嗽出膿血痰涎

桑根白皮

炙剉

麥門冬

焙去心

款冬花

各一兩

貝母

去心

甘

草黃明膠

炙令燥乾  
剉各半兩

右麤擣篩每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服日

三

萊菔子煎 治咳嗽多痰上喘唾膿血

萊菔子

研爛半兩

桃仁

去皮尖雙仁研如膏

杏仁

去皮尖雙仁研如膏

蜜

酥 錫

各一兩

右慢火同煎如稀錫每服半匙沸湯化下不拘時候

桂心散

出聖惠方

治咳嗽唾膿血氣短不得眠卧宜服

桂心

三分

人參

三分

去蘆阿膠

一兩 碎炒

紫菀

三分

去苗熟地黃

一兩半

桑白皮

二兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓入黑錫半兩更煎候錫消不拘時候溫服

杏仁膏

出聖惠方

治咳嗽喘急候中似有物唾血不止



杏仁

二兩湯浸去皮尖雙仁炒微黃研如膏

酥

三兩碎炒黃

生薑

汁一合白蜜

五合紫蘇子

二兩微炒研如膏

右件藥相和于銀鍋內以慢火熬成膏每服以溫粥

飲調下一匙每日進四五服

生薑煎丸

一名生薑汁煎出千金方

治上氣咳嗽喘息喉中有

物唾血

生薑汁

杏仁

各二升

糖

蜜

各一升

猪膏

二合

右先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙拭令靜擣如膏

合薑汁糖蜜等合煎令可丸每服如杏核一枚日夜六七服漸漸增加

鯮甲丸

出聖惠方  
出宣明論

治吐血咳嗽神効

鯮甲

一个九肋  
者醋炙

柴胡

酒浸  
一兩

杏仁

童子小  
便浸炒

甘草

炙各  
一兩

人參

半兩

右為末蜜和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸煎生薑湯下又一方用厚朴一兩薑製

雞子湯 療咳逆唾膿血

雞子

一枚

甘草

炙二分

甘遂

一分

大黃

二分

黃芩

二分

右切以水六升煮取二升去滓內雞子攪令調盡飲之良忌海藻松菜

瀉肺湯 療肺中膿咳嗽血氣急不安卧

芎藭

麻黃

去節

細辛

川椒

炒出汗

當歸

各一兩

右切以水七升煮取三升分為三服日進微汗或吐膿血忌生菜一方有生薑一兩

鍾乳七星散

出聖惠方

治寒冷咳嗽上氣胸滿唾膿血

鍾乳 礬石 款冬花 桂心

各等分

右治下篩作如大豆七聚七星形以小筒吸取酒送下先食服日三不知加之數試大驗又云臨卧吸服之

黃耆散

出十便良方

治咳嗽唾血

黃耆

糯米

炒

阿膠

各等分

右搗羅為細末每以米飲調二錢七服不計時候

薤白湯 治久患咳嗽肺虛將成癆瘵吐血

鱉甲

去裙襖  
醋炙

阿膠

炙令燥  
各二兩

鹿角膠

炙令燥

甘草

炙剉  
各一

兩

右麤篩每服二錢水一盞入薤白二寸同煎七分去

滓食後卧服

白前湯 療久嗽兼唾血

白前 桑白皮

桔梗

各三兩

甘草

一兩炙

右切以水二大升煮取半大升空腹頓服若重者十數劑忌猪肉海藻松菜

人參散

出肘後方

廣濟療癰吐膿損肺

人參

三分

瓜蒂

二分

杜蘅

五分

右為散平旦空腹以熱湯服方寸當吐淡水惡汁一二升吐已復煮白粥食淡水未盡停三日更進一服忌生冷油膩猪魚肘後古今錄驗用杜蘅三分人參一分服一錢若有攪停滯在心胸膈中不利宜當服之

茅根散

出聖惠方

治咳嗽傷肺唾血宜服

茅根

二兩

生地黃

二兩

生薑

一分

右細剉和勻每服半服以水一中盞煎至五分去滓

不拘時溫服

黃耆方

一名黃耆四一散出肘後方

治虛中有熱咳嗽膿血口舌

咽乾又不可服涼藥

好黃耆

四兩

甘草

一兩

右為末每服三錢如茶點羹粥下亦可服

貫衆湯

治年久咳嗽出膿血

貫衆

劉蘇楞木 劉各一兩

右麤擣篩每服三錢水一盞入薑三片煎七分去滓

溫服日二

療積年咳嗽唾膿血

葭苈

二升

大棗

一百顆 青州者

右以水三大升取馬糞燒火煎熟之候令汁盡取棗  
早晨服一枚日中一枚日暮一枚不覺漸加口乾胸  
熱則以為度不吐下痢忌並如前



法治一切肺病咳嗽膿血及唾血不止

出千金方

右好酥三十斤三遍煉停取凝當停出醍醐服一合  
日進三服瘥止一切藥皆不出此神方

又方

出千金方

右以三煉酥如雞子黃適寒溫灌鼻中日再夜又以  
局方大阿膠丸加木香少許食後服

華蓋散

出三因方

治肺虛或感風寒暑濕及勞逸抑鬱憂

思喜怒飲食飢飽致臟氣不平咳嗽膿血漸成肺痿

憎寒發熱羸瘦困煩皮膚甲錯將成癰瘡

甜葶藶

半兩隔紙炒

茯苓

人參

細辛

苦葶藶

半兩

隔紙炒

乾薑

炮

桔梗

剉炒

杏仁

去皮尖麤炒

紫菀

款冬花

去梗

甘草

炙

陳皮

各一兩

右為細末用羊肺一個心血不透者切細研爛旋旋入藥滲肺內再研勻藥盡為度泥土墻上以濕紙七層葢覆每日去紙一層七日藥就後乾刮下再研羅為細末每服二錢溫酒鹽湯調下米飲亦得空心日

進二服

麻黃湯 療新久咳嗽唾膿血連年不瘥晝夜喘息

麻黃

去節四兩

桂心

二兩

甘草

二兩

大棗

十四枚擘

右切以水九升煮取三升去滓分作三服日進溫用  
有効忌海藻松菜生葱等物

白朮丸

出指南方

治喘嗽時血

麥門冬

人參

地黃

白朮

澤瀉

茯苓

大豆

各一兩

桑白皮

五錢

右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸用米

飲下

四聖散

出經驗良方

治咳嗽有血

晉鹽

槐花子

乾葛

山梔子仁

各等分

右為末每服二錢加烏梅甘草少許水一盞同煎至

七分食後服之

天門冬丸

出永類鈴方

止嗽潤肺安血吐血咯血

天門冬

一兩

甘草

杏仁

炒

貝母

白茯苓

阿膠

炒各  
半兩

右為末蜜和丸如彈子大每丸嚥津含化日夜可服  
十丸不拘時

大効潤肺杏仁散

出衛生  
家寶方

治咳嗽上氣喘急唾血咯

血

紫菀

一兩半  
去溼

半夏

一兩  
煮

五味子

一兩

杏仁

湯浸去皮  
尖泡七次

罌粟殼

半兩  
炙

紫蘇葉

右麤末每服三錢薑三片棗一枚水一盞半煎至八

分去滓食後服

治肺嗽吐血

出本草

以萊菔研如泥和麴作餅飪食之佳飽食亦不發熱

治積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿血

出本草

以蘿蔔子一合研煎湯食上服之

參香丸

出朱氏集驗方

治咳嗽吐紅

辰砂 人參 乳香

右各等分以烏梅肉為丸麥門冬湯下

藁本湯

出朱氏集驗方

治男子咳嗽吐紅不止

藁本

二兩

晉礬

青皮

陳皮

罌粟皮

殺而各一

右五味不犯鉄器杵爛用瓦瓶久煮為妙食後服之

咳嗽痰唾稠粘

附論

夫肺氣壅實上焦有熱飲水停留在於胸膈與熱相搏  
滯積而成痰也肺主于氣令邪熱搏于肺氣氣道否澁  
不得宣通但心胸煩悶痰滯不利故令咳嗽痰唾稠粘  
也

方

天門冬膏

出聖惠方

治咳唾稠粘上氣喘急心胸煩悶不

能飲食

天門冬

二兩半  
去心焙

紫苑

一兩去  
蘆頭

桔梗

一兩去  
蘆頭

貝母

一兩

半煨  
黃

赤茯苓

三兩

桑白皮

一兩  
剉

木通

一兩  
剉

以上七味俱搗羅為末

生地黄汁

五合

麥門冬汁

二合

生薑汁

一合

藕汁

二合

酥

二合

白蜜

三合



右將諸藥汁及酥蜜內于銀鍋中入諸藥末都攪令勻以慢火熬成膏不計時候以粥飲調下一茶匙

天門冬丸

出聖惠方

治肺臟壅熱咳嗽痰唾稠粘

天門冬

一兩半  
去心焙

百合

二合  
合前胡

前胡

三分去  
蘆頭

貝母

三分  
微黃

半夏

三分湯浸  
七遍去滑

桔梗

三分去  
蘆頭

漢防己

三分  
赤茯苓

三分

生乾地黄

三分  
杏仁

三分湯浸去皮尖雙  
仁麩炒微黃研如膏

右為末鍊蜜和擣三百杵如梧桐子大每服二十

丸生薑湯下日進三服

旋覆花散

出聖惠方

治咳嗽痰唾稠粘肩背壅悶喘促不

食

旋覆花

一兩

紫菀

一兩半

桔梗

一兩去蘆頭

射干

一兩

川升麻

一甘草

三分炙

陳皮

三分湯浸去白穰

麻黃

三分去根節

大腹

皮

三分

杏仁

三分湯浸去皮尖雙仁炒微黃

右為散每三錢一服水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不拘時候溫服

細辛散

出聖惠方

治咳嗽痰唾稠粘心胸壅滯飲食減少

細辛

一兩半

去苗土

五味子

三貝母

一兩煨

赤茯苓

苓一兩

杏仁三分湯浸去

人參

三分去

甘草

一分炙

青橘皮

三分湯浸去白穢

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不拘時候溫服

木通散

出聖惠方

治咳嗽痰唾稠粘不散胸中壅悶

木通

半兩

麻黃

半兩去根節

甜葶藶

半兩隔紙炒令紫色

松羅

一兩

桔梗

一分炙

烏梅

半兩

桑白皮

半兩

剉

右為散每服四錢水一中盞煎至七分去滓溫服以吐為度虛羸人相度服之

桔梗散

出聖惠方

治肺氣咳嗽痰唾稠粘

桔梗

一兩去蘆頭

紫菀

一兩去苗土

桑白皮

一兩剉

木通

一兩剉

旋覆花

三分

檳榔

一分

款冬花

三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至七

分去滓不計時候溫服

前胡散

出聖惠方

治咳嗽涕唾稠粘心胸不利時有煩熱

前胡

一兩去蘆頭

麥門冬

一兩半去心

貝母

一兩煨黃

桑白皮

一兩

剉甘草

一分炙微赤剉

杏仁

半兩湯浸去皮尖雙仁炒

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不拘時溫服

皂角丸

出聖惠方

治咳嗽上氣痰唾稠粘

皂角

三挺大者去黑皮酥炙令焦黑色

旋覆花

一兩

杏仁

一兩湯浸去皮尖雙

仁炒研如膏

右為末蜜和丸如梧桐子大每服十丸食後煮棗粥

飲下

咳嗽不得卧

附論

夫肺氣不足為風冷所傷則咳嗽而氣還聚于肺則肺脹邪氣與正氣相搏不得宣通胸中痞塞痰飲留滯喘急短氣晝夜常嗽故不得睡卧也

方

寧氣湯

出御藥院

治肺氣不利咳嗽聲重咽嗑乾燥痰唾

稠粘不得睡卧

甘草

炙

杏仁

去皮尖  
麩炒

紫菀

去皮  
皮桔梗

各七錢半

五味子

甜葶藶

隔紙炒

人參

半夏

生薑製

紫蘇葉

桑白皮

陳橘皮

去穰各一兩

御米穀

二兩蜜水淹一宿炒黃

右為末每服五錢水一大盞生薑七片煎至六分去

滓稍熱食後服

治肺氣咳嗽不得睡卧

出聖惠方

人參

一兩去蘆頭

大腹皮

剉一兩

白茯苓

三分微炒去刺

百合

麥門冬

三兩去心

枇杷葉

半兩拭去毛炙黃

桔梗

三分去蘆頭

葛根

三分  
剉

黃芩

三分

赤茯苓

葡萄枝

三分  
剉

酸棗仁

一兩  
微炒

香令

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不拘時

溫服

人參散

治七情所傷飲食不美憂悶之氣忽患咳

嗽有痰倒頭不得氣急喘促睡卧不得每日咽喉如

拽鋸之聲不思飲食胸膈滿悶用之見効

枳殼

陳皮

杏仁

甘草

檳榔

香附子



火麻灰 桑白皮 人參錢各一 紫蘇錢二

右咬咀每服用水二盞薑三片棗一枚煎服肚腹實

加枳實青皮有痰加半夏

百部散

出聖惠方

治咳嗽晝夜不得卧胸中不利

百部

兩一 細辛

兩一 貝母

微黃 甘草

赤劉 紫菀

兩一

兩一

半去 桂心

兩一 白朮

兩一 麻黃

根節 五味子

兩一

兩一 杏仁

二兩湯浸去皮 尖雙仁麩炒黃

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不計時溫服

天門冬膏 治咳嗽肺臟壅熱咽喉閉塞不得睡卧

天門冬

二兩去心

麥門冬

二兩去心

款冬花

一兩

貝母

一兩微黃

紫菀

一兩去苗土

白朮

一兩

生地黄汁

五合

白蜜

五合

杏仁

一兩

湯浸去皮尖雙仁麩炒研如膏酥二兩

右天冬等六味以水五盞煎至一大盞去滓內入地

黃汁杏仁膏酥蜜等子銀鍋中以慢火煎成膏盛不

津器中每日夜五七度含一茶匙嚥津下極効

百部根散湯

治嗽不得卧兩眼突出

百部根

生薑

各一

細辛

甘草

各三

貝母

五

味子

白朮

各二

桂心

四

麻黃

六

右咬咀以水一斗二升煎分三服去滓古今錄驗用

杏仁四兩紫苑三兩

治咳嗽氣喘上焦煩壅不得睡卧

赤茯苓

二

桑白皮

一

人參

一

麥門冬

一

去心

一

甘草

半兩炙

酸棗仁

三

麻黃

一

去

大腹皮

一

赤劉

分

根節

劉

杏仁

三分湯浸去皮尖  
雙仁炒研如膏

右為散每服水一中盞生薑半分煎至五分去滓溫服不拘時

又方 調肺止嗽消痰順氣如嗽不得息者服之必得安寧

佛耳草

白茯苓

去皮

款冬花

陳皮

湯浸去白

桔梗

知母

貝母

各一兩

漢防己

猪牙皂角

去皮酥炙各二兩半

右為細末每服三錢水一大盞入黃蠟烏梅各少許

同煎至五分去烏梅和滓溫服

小青龍湯 治感寒邪喘水飲咳逆倚息不得卧

麻黃 芍藥 細辛 桂心 乾薑 甘草

炙各三兩

半夏

半升

右以水一斗入麻黃減二升去上沫乃內諸藥煮取三升分為三服弱者服半升若渴去半夏加桔萎根三兩若微痢去麻黃加薤花如雞子大若飲食噎者去麻黃加附子一枚若小便利小腹滿者去麻黃

加茯苓四兩若喘者去麻黃加杏仁半升咳而上氣  
腹脹其脉浮心下有水飲者胸中缺盆痛加石膏二  
錢研

安眠散 治上喘咳嗽久而不愈者

款冬花 麥門冬去心 烏梅肉 佛耳草各二錢半 陳皮

去白半兩 甘草炙三錢半 御米殼七錢半酥炙

右為細末每服三錢水一盞入黃蠟如棗核許同煎  
至八分去滓大溫臨卧服之

寧神丹 治遠年近日咳嗽喘滿不得眠卧或因風寒  
入于腠理不得眠者並皆醫療

防風

斤一

烏梅肉

桔梗

甜葶藶

斤各半

人參

知

母

紫蘇葉

兩各四

右為細末麻黃膏子為丸如彈子大每服一九水一  
盞煎至四五沸化開如不開時用匙杓研開臨卧時  
熱服汗出為度煎藥可用銀石沙磁器內不用銅鐵  
器服藥後忌房室驢馬肉雁雞猪肉魚鴨等又忌濕

麴油膩發病等噤怒熬麻黃湯法用麻黃五斤去根切作二寸走水洗過用長流水三斗運取于銀石器內同麻黃熬水至五升將麻黃就于水內一把搓盡去麻黃將麻黃水用羅子隔去淨再于銀石沙器內熬成膏點些入水中不散為度將前項藥末同麻黃膏子相和勻杵一千以上然後為丸

治咳嗽喘氣不得睡卧宜服

桑白皮

剉一兩

木通

剉一兩

桔梗

三分去蘆頭

紫蘇苗

三分大



腹皮一兩

剉

款冬花

半兩

郁李仁

三分湯浸去皮

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至五分去

滓不拘時候溫服

治咳嗽晝夜不得睡卧咽喉作聲

川烏頭

半兩炮裂去皮臍

桔梗

半兩去蘆頭根

乾薑

半兩炮裂剉

前胡

三分去蘆頭

射干

半兩

五味子

半兩

川椒

半兩去目及開口者炒去汗

右為末煉蜜和搗二百杵圓如半棗大每服一丸

含嚥津日進三服四服

治咳嗽不得睡卧

杏仁

三兩湯浸去皮尖雙仁麩炒研如膏

黃耆

一兩剉

酸棗仁

一兩微炒

青

橘皮

半兩湯浸去白穰

甘草

半兩炙微赤剉

桑白皮

一兩剉

右件藥除杏仁外擣羅為末入杏仁膏拌勻鍊蜜和

搗三百杵丸如梧桐子大每服二十丸不拘時以粥

飲下一方有麻黃

青龍散

一名橘皮五味子湯

治咳嗽上氣不得卧及嘔吐

出御藥院

人參

去蘆頭

陳皮

去白

五味子

紫蘇葉

各一兩

右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓  
溫服不拘時

知母丸 治遠年近日一切喘嗽連不得睡卧者

知母 貝母

甜葶藶

炒黃色

杏仁

去皮研各等分

右為細末用錫罐籠內蒸七遍與藥末相和為丸如  
豌豆大每服三十丸淡薑湯下蜜湯亦可

安眠散 治一切咳嗽夜不得卧睡

罌粟殼

去蒂根

杏仁

烏梅

甘草

右咬咀每服半兩白水煎服

定喘餅子 治咳嗽虛喘悶亂不眠

白礬 貝母 苦葶藶

並生各一兩

右為細末每服一錢白麪和作餅子慢火燒熟細嚼生薑湯下食後日進二服

葶藶子散 治咳嗽引氣不得卧或遍體氣腫或面腫或足腫上氣並主之

右用葶藶子三升微火炒搗篩為散以清酒五升漬

之冬七日夏三日初服如桃大日三夜一冬日二夜  
二量其氣力取微利一二為度如患急困者不得待  
日滿亦可以綿紬絞即服其葶藶單莖面上葉端出  
角麓且短又有一種苟芥草葉近根下作奇生角細  
長取時又須分別前件乃二種也

殭蠶湯

治嗽喘喉中如鋸不能睡卧

方見喘門  
喘嗽類

五味子湯

治咳嗽晝減夜加不得眠卧食即吐逆

五味子

蒺藜子

炒去  
角

麻黃

去根節熱  
掠去沫焙

桑根白皮

剉白石脂

杏仁

去皮尖雙仁炒

百合

各一兩半

貝母

煨去心

款

冬花

枳殼

去穰麩炒

紫苑

去苗土

紫胡

去苗各一兩

旋覆花

半兩桂半兩去麁皮

右為散每服五錢水一盞半入生薑五片粳米五十粒煎取八分去滓溫服不拘時候

無憂丸 治年深日遠咳嗽涎喘夜卧不安

經霜桑葉

經霜草麻葉

御米殼

去蒂蜜炒各一兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸食後白湯

化下日進一服

治咳嗽不得睡

杏仁

去皮尖

人參

胡桃肉

生薑

各等分

右搗成膏加熟蜜丸如彈子大臨睡嚼一丸

又方

一名治痰喘方

治咳嗽不得睡

方見喘門喘類

咳嗽熏法

方

療飲咳烟法

鍾乳

研

白石英

研

人參

丹參

研

雄黃

各七分研

水銀

分研三

烏羊腎脂

一具

淨紙

十張

右為末以水銀投藥裏細研使入諸藥羊脂熬取置  
紙中令勻平使厚一分散藥令周遍剪紙一張作三  
分瘦弱婦人五日用半寸熏未服藥前齋戒五日服  
藥後一百日忌五辛酒肉此一劑得療五十年上氣  
悉皆愈忌生血物

治咳嗽



款冬花三錢 鵝管石一錢 寒水石二錢 雄黃一錢 鍾乳

粉一錢 箭草一錢 枯礬半錢 官桂一錢

右為細末令病者睡着喚醒急用作筒子燒烟吸之

清茶送下

治咳嗽用藥熏方出聖惠方

梔黃一錢 猪牙皂莢末一錢 蠟一分 膩粉一錢 人乳一大合

麻仁一合 研爛

右件藥都以人乳調和令勻以蘆葦筒長一尺二寸

破作四片一尺塗藥二寸令空却令相合以綿繫定  
須令心中通氣餘有一半藥塗在一張蠟紙上裹定  
筒子熬乾一頭點火一頭吸烟逐口嚥下如覺口乾  
便喫稀粥喫小蜜其烟筒子歇口時權以物塞定如  
此熏三四遍肺內有蟲即吐出如無蟲亦有黑涎及  
出血吐便瘥

秘方煙筒兒 治一切不問遠近日久咳嗽及婦人胎  
前產後產前皆治

雄黃

錢五

佛耳草

款冬花

錢各二

人參

艾葉

錢各三

右為末以蠟打厚紙潤四寸豎八寸長捲一眼裝藥  
在內燒煙熏喉

煙筒兒

雄黃

款冬花

各二兩

硼砂

錢二

右為細末雞子青一個攤紙上晒乾做管每日空心  
火上燒煙吸之一口用茶送下忌酸鹹等物  
治久冷痰咳嗽及多年癆嗽服藥無効者熏法

雄黃

雌黃

不夾石者各半兩  
二味同研極細

蠟三兩

右先鎔藥成汁下藥末攪勻候凝刮下用紙三五段  
濶五寸長一尺鎔藥蠟塗其面令厚以箭捲成筒子  
令有藥在裏乾令相著乃拔去箭臨卧熨斗內盛火  
然筒子一頭令有煙乃就筒子長引氣吸取煙陳米  
飲下又吸每三吸為一節當大咳嗽咯出冷涎即以  
衣覆卧良久汗出若病三五年者二三吸即瘥十年  
以上瘦甚咳聲不絕胸中常有冷痰服過寒藥補瀉

俱無効者日一為之不過五七日愈昔有人病嗽胸  
中常如冰雪三年治之莫愈用此法即瘥

治久嗽

熟艾

款冬花

各二錢

雌黃末

半錢

右件用紙緊捲燒口吸烟湯送下

葭菼子散

治十年呬嗽

葭菼子

新者

木香

雄黃

無石者研各半兩

右為散與雄黃同研令勻用青紙一張先以羊脂塗

次以散藥再糝脂上捲裏之早晨空腹燒令煙出吸  
十噍每日三度

款冬花熏方 治肺虛咳嗽日久

款冬花 木鱉子

各一兩

右細剉每服二錢燒酒餅慢火焚之吸煙良久吐出  
涎凡如是熏五六次每次以清茶潤喉次服補肺藥  
治咳嗽用藥熏方

右熏黃一兩細研以蠟紙一張上用熏黃薄塗令勻

與蠟相乳入急捲如上法熏之以吐為度七日將息後喫羊肉羹補之

治咳嗽用藥熏方

右以爛青布廣四寸上鋪熟艾上又布少白礬末礬上又布少熏黃末及少鹹又布少豉末急捲之以火燒令着內乾罐子中以紙縵罐子上面開一小孔以口吸取烟嚔之以吐痰涎為度若心悶時略歇煙盡乃止每日三度作不過三五度瘥三七日慎油膩物

治久咳嗽不瘥熏方

右每旦取款冬花半兩用小蜜拌使潤內于一小罇中以磁碗合罇磁碗底上鑽一孔孔中內一小竹筒如無竹葦筒亦得其筒稍長作之碗當相合令密安筒處以麴泥之勿令通氣罇下着炭火燒之少時款冬花煙自筒出則口含筒吸取煙嚥之如覺心少悶須暫舉頭即以指捻筒頭勿使漏烟吸使盡即止凡如是三日一度為之待至六日則飽食羊肉餽飫則



便永瘥

治咳嗽腹脹上氣不得卧亦治身體水腫用藥熏之

右用蠟紙一張以熟艾勻薄布遍紙上熏黃末一分  
款冬花末三分並布艾上著一葦筒捲之每取三寸  
以簾綿繫定燒下頭吸煙嚙之盡三劑即瘥後斷鹹  
醋一百日

治嗽熏法及久嗽不瘥者

右以熟艾薄薄布于紙上廣四寸後以硫黃末薄布

艾上務令調勻以荻一枚如紙長捲作十枚先以火  
燒纏下去荻煙從孔出口吸煙嚥之取吐止明旦復  
熏之如前日熏一二自瘥後食白粥其餘皆忌恐是  
熏黃如硫黃見火必焰炙

款冬花散 治年深日久咳嗽肺虛及寒熱

右款冬花不拘多少于密室中如香焚之煙起以筆  
管吸其烟則嚥之或坐卧處如香焚之不吸亦妙重  
病數日見効輕者便効一方咽乾口燥清茶送下

歌曰

遠年咳嗽人難治 休要相醫枉使錢

細研款冬花作善 燒煙口吸奔喉咽

三奇散 治一切咳嗽不問新舊喘頑不止晝夜無時

款冬花

文二百

熟乾地黃


文二

佛耳草

文五十

右三味焙乾碾為麤末每次二錢裝猛火于香爐中  
燒之用紙作筒子一頭大一頭小如粽樣安在爐上  
以口吸噉盡為度即以清茶嚥下有涎出吐之經驗

方陳氏云予家一隻久苦此疾數令醫治如水投石  
偶在曲江置得沅州一婢親製此藥兩服而愈



普濟方卷一百六十二

# 欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百六十三

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典籍臣劉景岳

謄錄監生臣林大本

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十三

明

周王朱橚

撰

喘門

總論

夫五臟皆有上氣喘咳但肺為五臟華蓋百脉取氣于肺喘既動氣故以肺為主病者右手寸口氣口以前脉陰實者手太陰經肺實也肺必脹上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀自汗皆肺實證若氣口以前脉虛者必咽乾無

津少氣不足以息此乃肺虛氣乏也 夫諸氣者皆屬于肺諸喘者亦屬於肺是以人之一呼一吸謂之息呼吸之間脾受其氣通乎榮衛合乎陰陽周流一身無過不及然後權衡得其平矣將理失宜六淫所傷七情所感或因墜墮驚恐度水失跌仆飽食過傷動作用力遂使臟氣不和榮衛失其常度不隨陰陽出入以成息促迫于肺不得宣通而為喘也診其脉滑手足溫者生脉濇四肢寒者死數者亦死謂其形損故也亦有痰停胃



院痰與氣搏肺道壅塞亦令上氣夫有肺虛挾寒而喘者有肺實挾熱而喘者有水氣乘肺而喘者有驚憂氣鬱肺脹而喘者又有胃絡不和喘出于陽明之氣逆真元耗損喘生于腎氣之上奔如是等類皆當審證而主治之肺虛肺寒必有氣乏表怯冷痰如冰之證法當溫補如官桂阿膠之類是也肺實肺熱必有壅盛胸滿外關上炎之狀法當用清利如桑白皮葶藶之類是水氣者漉漉有聲怔忡浮腫與之逐水利小便如小半夏

茯苓湯五苓散葶驚憂者惕惕悶悶引息鼻張與之寬  
中下氣如四七湯桔梗枳殼湯葶陽明之氣下行令逆  
而上行古人以通利為利如分氣紫蘇飲指迷七氣湯  
加半夏二陳湯加縮砂施之為當真陽虛憊腎氣不得  
歸元固有以金石鎮墜助陽接真而愈者然亦不可峻  
驟且先與安腎丸八味丸葶否則人參煎湯下養正丹  
主之雄黃麻黃馬兜鈴漢防已雞內金諸品非不主喘  
也如前治法大要究其受病之源至若傷寒發喘表汗

裏下脚氣喘滿疏導收功此則但療本病其喘自安然  
喘有利下而愈者亦有因瀉而殂者喘有數年沉痾而  
復瘳者亦有忽因他疾大喘而不救者汗出髮潤喘者  
為肺絕身汗如油喘者為命絕直視譫語喘滿者不治  
諸有篤疾正氣欲絕之時邪氣盛行多壅逆而為喘然  
則喘之危惡又安可以尋常目之 婦人產後喘急為  
病尤亟因產所下過多滯血暴竭衛氣無所生獨聚于  
肺故令喘急謂之孤陽難治治法當推所感詳虛實冷

熱治之縱是得愈必年年遇此時必發喘急者有之千金云治肺熱悶不止胸中喘急客熱往來欲死不堪服藥此可以治胸中喘用桃皮芫花各一升二物以水四升煮取一升半去滓以布蘸汁薄胸中再蘸再薄即効凡上喘中滿酸心腹脹時作聲痞氣上下不能宣暢叔和云氣壅三焦不得昌也可用獨聖散吐之次用導水禹功散輕瀉三五行使上下無礙氣血宣通並無壅滯後復平胃散五苓散益元甘露散分陰陽利水道之

藥則愈矣

喘

方

團參丸

出簡易方

治五臟相乘榮衛失度不能隨陰陽出

入以成呼吸故氣經于臟不能受納諸氣促迫上併于肺壅管溢而氣爭則喘

桑白皮

剉炒

團參

各三兩

人參

白朮

杏仁

去皮尖炒

麥

門冬

去心

桂心

陳皮

訶子

炮去核

附子

炮去皮臍

大腹

皮劉檳榔劉

炒劉芫花炒

澤瀉

枳實炒

吳茱萸

半

夏麴

各半兩

右為末薑汁糊為丸如梧桐子大每服二十丸食前

米飲下未効漸加至三十丸

紫蘇子湯

出危氏方

治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘

促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虛緊而

瀉

紫蘇

一兩一方用紫蘇子

大腹皮

草果仁

半夏

湯浸洗七次

白朮

枳實

去穰炒

人參

甘草

炙各半兩

厚朴

去皮薑汁製

木香

不見火

陳皮

木通

右剉散每服四錢水一盞薑三片棗二枚煎至七分

服不拘時

杏參飲

出濟生方

治因墜墮驚恐渡水跌仆疲極筋力喘

急不安

人參

桑白皮

橘紅

大腹皮

檳榔

白朮

訶子

麩裏煨取肉

半夏

湯泡七次

桂心

不見火

杏仁

去皮尖炒

紫苑

洗  
甘草 炙

右等分咬咀每服四錢水一盞半生薑五片入紫蘇  
葉七葉煎至七分去滓溫服不拘時候

玉華散

指出直  
指方

治咳嗽上喘調順肺經清利咽膈安和

神氣

甜葶藶

焙香

桑白皮

炒

天門冬

去心

馬兜鈴

半夏

製

紫苑

杏仁

去皮尖

貝母

炮

百合

人參

各半兩

百部

甘草

炙各  
一分



右剉散每服二錢半薑四片大棗三枚服一方無生

薑煎

神祕湯

出直指方

治水氣作喘

陳皮 北梗 紫蘇 人參 五味子 檳榔

桑白皮

炒

半夏

製

甘草

炙各等分

雄黃丸

出直指方

治喘

雄黃

研

白礬

煨

木香

生葶藶

各一分

馬兜鈴

去殼

雞

內金

淡豆豉

各三錢半

信砒

絳芒管者研

生用一錢半

右各取實分數並細末研米漿煮糊為丸如胡椒大  
每服五丸清茶稍冷臨卧送下至七丸次日飲食勿  
用熱漿豆生嚼解砒霜毒

加減瀉白散

出拔  
萃方

治陰氣在下陽氣在上咳嗽喘促

桑白皮

一兩

甘草

五錢

陳皮

五味子

人參

各五錢

地

骨皮

七錢

青皮

二錢

白茯苓

一錢

右以咀每服四錢水一盞半入粳米十粒煎至一盞  
去滓食後服之

加味控涎丸

出危氏方

治風熱上壅或中脘停留水飲喘

急及四肢浮腫脚氣入腹平常腹中痰熱諸氣結聚

服之得利則効

大戟 芫花 甘遂 甜葶藶 巴豆

各一兩去殼

黑

牽牛

三兩炒去頭尾

白芥子

炒二兩

右為末米糊為丸粟米大每服三七丸清茶送下或

溫水亦可服後莫可服甘草藥及熱水

五味子湯

出直指方

治寒熱喘

北五味子

杏仁

橘紅各一兩

麻黃

去節一兩半

甘草

炙生乾薑

辣桂

各半兩

右麤末每服二錢半蘇三葉煎服肺虛加炒阿膠喘

甚加馬兜鈴

五味子湯

百一選方

治肺虛寒理喘下氣去痰飲務觀郎

中妍發喘嗽諸藥皆不瘥得此三服遂愈

乾薑

炮半兩

甘草

炙半兩

陳皮

去白三分

桂

茯苓

五味

子

各一兩

右剉為散每服五錢水一大盞煎至六分熱服

麥門冬湯

出三因方

治嘔逆上氣喘急咽喉不利止逆下

氣

麥門冬

去心一兩一錢

半夏

製六錢

人參

一分

甘草

炙一分

粳米

二錢大棗

右為麤散每服四錢水三盞棗三個煎至六分去滓

空心服之

五味子湯

出百一選方

治寒喘

橘皮

三兩  
去白

甘草

一兩  
半炙

麻黃

四兩  
去根節

杏仁

二兩  
炒去皮尖

真

北五味子

二兩  
重

右為麤末水一盞半藥末二錢煎七分去滓通口服

不拘時如喘甚加藥末入馬兜鈴桑白皮同煎夏月

減麻黃一兩無不効者昔日高申之每苦喘疾發甚

時非此不能治

秘方黃丸子

出簡  
易方

治消痰定喘

雄黃

研

雌黃

研各  
一錢

山梔

七枚  
去皮

萊豆

四十  
粒

信砒

少  
許

右為末麪糊和為丸菴豆大每服兩丸生薄荷清茶  
臨卧之時送下

神秘散

一名神秘湯  
出三因方

治定喘嗽補心腎下氣

阿膠

三兩三分炒

雞腔脰

一兩半

白仙茆

半兩兩米泔浸  
三宿晒乾炒

團

參一分

右為末每服二錢糯米飲空心下

八寶丹

出朱氏  
集驗方

治痰實發喘

雄黃

雌黃

朱砂

信砒

並生用

白礬

飛過

菴豆粉

生黑豆

生

巴豆

去油

皂角

炙去黑皮  
各一錢

右為細末煮糊為丸如菜豆大磨刀水下一九至三

丸

四磨湯

出濟生方

治七情傷感上氣喘息妨氣不食

人參

檳榔

沉香

天台烏藥

右各濃礬水和作七分盞煎三五沸稍溫服或下養

正丹黑錫丹

杏參散

一名杏參湯  
出和劑方

治上氣喘滿咳嗽倚息不能卧



除痰下氣胸脇脹滿神思昏憤並宜服之

杏仁

桃仁

並麩炒  
去皮尖

桑白皮

蜜炙三度  
泔浸一宿  
控乾各一兩

人

參

一兩

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一箇煎至七分

服不拘時

五靈丸

出直  
指方

治肺喘久不愈漸成息賁

木香

半兩

馬兜鈴

去殼  
炒

葶藶

微炒各  
一分

川五靈

二兩  
半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九杏仁

二枚槌碎薑三片煎湯下一方棗肉為丸

人參丸 治喘

人參

二錢半

苦葶藶

炒五兩

南星

三錢

半夏

三兩

右為細末生薑自然汁麴糊為丸如黍米大每服五十丸薑送下漸加亦可小兒減數服之

坎離湯

出朱氏集驗方

專定喘

革澄茄

石菖蒲

各半錢

白朮

茯苓

杏仁

各一錢

甘草

半夏

泡七次

紫蘇子

各二錢

右為末水一盞半煎不用薑

二黃丸

出濟生方

治停痰在胃喘息不通呼吸欲絕

雌黃

雄黃

各一錢

右研末羅極細鎔黃蠟為丸如彈子大每服一丸半夜時候熱煮糯米粥乘熱以藥投在粥內攪轉和粥喫之

棗杏丸

出朱氏集驗方

治喘

大棗

五十箇去核

葶藶

黃者二兩微炒

杏仁

三兩去皮尖

右搗細末取棗肉研成膏為丸如梧桐子大每服三十丸桑白皮湯下當令人大便鴨溲不妨

杏參散

出仁存方

治喘氣息

桃仁

杏仁

並去皮尖炒

人參

知母

貝母

桑白

皮

米泔浸蜜炙三度

右等分為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七

分食後服

菖蒲煎

治肺中風喘鳴肩息

菖蒲 款冬花 紫苑 人參 桂心 各等分

右為細末煉蜜和丸皂子大每服一丸煎糯米飲化

下

紫參湯散

出拔萃方

治形寒飲冷傷肺喘促痰涎不得安

卧

米穀

二兩蜜炮黃色

麻黃

桔梗

五味子

甘草

炙紫

參

各一兩

右為細末每服四錢水煎臨卧服

神祕湯

出拔  
華方

若病人不得卧卧則喘者喘者水氣逆

上乘于肺肺得水浮使氣不通流其脉沉大宜服之

橘皮

洗

生薑

紫蘇葉

或用  
子

人參

桑白皮

炒各  
半兩

右以水三升煎至一升去滓分作三服溫用一方有白茯苓木香各二錢指迷方以五味子湯加去

桑白皮

玉蟬散

出仁  
存方

治氣發喘坐卧不得

人參

草麻葉

霜桑葉

各半  
兩

訶子肉

半  
兩

鍾乳粉

一兩

右搗羅細每服二錢溫糯米粥飲調下每于食後服之

理氣丸 治氣不足動便喘促遠行久立皆不任汗出鼻乾心下急痛苦悲傷睡卧不安

杏仁

去皮尖麤炒研別

桂枝

去皮各一兩

益智

去皮乾薑炮各二兩

右為末蜜丸如桐子大以鍾乳粉為衣每服三十丸空心米湯送下

宣肺湯

出百一  
選方

治喘

細辛

甘草

各一兩

防風

二兩  
去蘆

麻黃

四兩不  
去根節

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服

天南星散

出本  
事方

定喘

南星

半夏

青皮

並炒  
令黃

白礬

煨各  
等分

右為末每服一錢好北棗去核入藥在內細嚼嚥下

治久患肺氣喘急至妙

用杏仁去皮尖二兩童子小便浸一日一換夏月一



日三四換浸半月取焙乾研爛極細每服一棗大丸  
薄荷一葉蜜一雞頭大水一中盞同煎取七分食後  
溫服甚者不過一劑瘥永不發動忌腥

棗杏丸

一名大乾  
棗三味丸

治喘

方見咳嗽門久咳  
類出仁存方

大黃散

出肘  
後方

治大熱行極及食熱餅竟欲飲水過多

衝咽不即消仍以氣呼吸喘息方瘥

大黃 乾薑 巴苳

各等  
分

右為末每服半錢若得吐下即愈

五礬散

治喘并痰嗽

一名炙肝散

五倍子

白礬

右各等分為末和勻每服三錢以生豬肺火上炙熟  
蘸藥末細嚼喫食後服一方用生豬肝蘸藥亦可漢  
陽公庫兵黃六者舊苦此病百藥不效于岳陽路上  
遇一道人傳此方兩服病不復發

杏仁散

治喘

馬兜鈴

一兩去  
杏仁

皮尖炒

右為末每服三錢水一盞煎至七分去滓食後服之  
定喘飲子

訶子肉

三

麻黃

四兩不  
去節

右為麤末每服四錢水二盞煎至一盞二分去滓入  
好臘茶一錢再同研至七分通口不拘時候臨卧服  
之尤佳立如神効老幼可服一方加人參二兩名訶  
參散本方只兩味

如神湯 治喘

茆根

一握生劉臨時取生者妙

桑白皮

右等分用水一碗煎至八分一服即止甚者三服

竹葉橘皮湯

治大走馬及奔趨喘乏便飲冷水因得

上氣發熱方

竹葉

三斤橘皮三兩

右件藥以水一斗煮取三升濾去滓分為三服令三

日服一劑

神秘方

治喘

右以猪爪甲二枚烧灰細研入麝香當門子一枚同研臘清茶調下

故錦散 治喘

右燒故錦一寸燒灰清茶調服神効

菰萋散 治喘

右用菰萋二箇入明礬一塊如棗子大入菰萋內燒煨存性為末將蘿蔔爛煮蘸藥末服之汁過口藥盡病除

大黃散 治肺喘

右用川大黃為末以新水調下

踈鑿飲子 治下氣定喘導涎消腫

人參 木通 半夏 附子炮 草薺仁 木瓜

秦艽 檳榔 杏仁 赤茯苓連皮 橘紅各一兩 厚朴

一兩 木香 甘草各半兩

右咬咀每服半兩水一盞半生薑七片煎至八分去

滓服不拘時

加減溲濕湯

出朱氏集驗方

先用靈砂合來復丹服若只丹

服靈砂則秘合則通次用後藥

嫩蒼朮

三錢炒

白朮

三錢

赤茯苓

四錢

丁香

縮砂仁

木瓜 神麴

綿薑 陳皮

草蓂

厚朴

製炒各三

錢甘草

二錢半

右前咬咀薑棗煎 厲端明得喘疾醫下痰疎導之  
藥引客邪腎經而兩足并外腎發腫有僧云此脾腎  
虛用此則大小便自流利

妙方

出鮑氏方

治喘息諸方治不効者

代赭石

煅末一兩

牡蠣

粉一兩

皂角

去皮尖一兩

貝母

半兩

右為末每服二錢壺水入麻油一二點調下

葶藶丸

出本事方

定喘急肺積

苦葶藶

一兩

當歸

肉桂

白蒺藜

乾薑

川烏

頭

吳茱萸

鱉甲

大杏仁

茯苓

人參

各半

兩

檳榔

一兩

右為細末煮棗肉和杵如梧桐子大每服二三十丸



薑棗湯下日進三四服不拘時候

皺肺丸

貝母炒知母 秦艽 阿膠炒款冬花 紫菀茸

百部去心糯米炒各一兩杏仁去皮尖別研四兩

右為末將羊肺一箇先以水灌洗看容得水多少即以許水更添些煮杏仁令沸濾過灌入肺中繫定以糯米泔煮熟研細成膏搜和前藥末杵數千下丸如梧桐子大每服五十丸食前桑白皮湯下

三分茶

出儒門  
事親

茶

二蜜二  
錢蜜兩

蕎麥麴

四兩

右以新水一大碗約打千餘數連飲之飲畢良久下

氣不可停人喘自止妙矣

葶藶散

出仁  
存方

治氣喘滿急腹脹不得卧

苦葶藶

炒搗細  
一兩

桑白皮

一兩  
陳皮

去白  
一兩

右為末每服三錢水一盞棗兒二箇煎至七分去滓

服之

人參胡桃湯

一名觀音散  
出直指方

治胸滿喘急不能睡卧

見方

咳嗽門  
痰嗽類

神應丹

出危氏方

治肺氣喘息晨夕不得睡卧不問久新

一服見効

砒石一兩 萊豆六兩

兩

右同煮以豆爛為度取出砒石入黃丹一兩同研爛  
用紙做捲五七重如豆筒又入砒石黃丹以黃泥固  
濟復燒紅為度又入黃丹一兩麪四分為丸如粟米

大又以黃丹二兩為衣每服二粒新井花水下得効  
即止

真應散

出三因方

治遠年喘氣急不能眠卧百藥無効者

右白石英四通明者以生絹袋盛用雄猪肚一箇以藥入線縫定煮熟取藥出再用猪肚一箇如前法煮三煮了取藥出控乾研為末以官局款冬花散二錢更以桑白皮二寸生薑三片棗二箇水一盞半煎至七分通口服猪肚亦可喫只不得用醬醋椒薑等調

和

治喘急妙方

北五味子

大甘草

等分  
為末

右用生薑自然汁調安在手心喫

葶藶散

出濟  
生方

治過食煎燂或飲酒過度致壅喘不得

卧及肺癰咽燥不渴濁唾腥臭

甜葶藶

炒

桔梗

去  
蘆

蘇薑子

川升麻

薏苡仁

桑白皮

炙

葛根

各一  
兩

甘草

炙半  
兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去

滓食後溫服

瀉肺湯

出御藥院方

治肺氣逆上甚

防己

陳皮

湯浸去穢

桔梗

去蘆頭

赤茯苓

杏仁

湯浸去皮

尖生用半兩

苦葶藶

二錢半

右咬咀每服一錢水一盞半同煎至六分去滓食後

溫服日進二錢或三服亦可

黃牛散

出仁存方

治肺熱脉滑大氣急喘滿

大黃一兩 白牽牛二兩

右為末蜜水調二錢立止又用皂角膏為丸亦可

半夏湯

出仁存方

治定喘下痰

半夏

一兩

甘草

三錢

皂角

炙去皮子半兩

右以胡桃肉三箇薑三片是夜服之湯嚥下即睡自

滓食後溫服

治痰喘方

出百一選方

右以胡桃肉三箇薑三片是夜服之湯嚥下即睡自

旦嗽上喘亦不作神驗如此未瘥再嚼胡桃并薑如  
前數且飲湯勿行動就枕即愈

定喘化涎

出肘  
後方

右用猪蹄甲四十九箇洗淨控乾每個指甲內半夏  
白礬各一字入磁罐子內封閉勿令煙出火煨赤去  
火細研入麝香一錢人有上氣咳嗽喘急用糯米飲  
下小兒半錢至妙

芫花散

出百一  
選方

治實喘肺氣脹喘急心胸滿若氣虛



而喘者不可服

芫花

不以多少醋浸一宿取出醋炒令黑焦為細末

大麥麴

一方作麴

右等分和拌極勻以濃煎柳枝酒調下立定一方不用酒水煎食後服之

葶藶湯

出朱氏集驗方

治肺壅氣喘急不得睡卧飲食不進

右用葶藶子三兩炒令黃搗為細末以水三升煮大棗三十枚得汁一升內藥中每服如棗大煎取七合頓服一方大人分三服小兒分四服

治氣喘痰盛

右以檳榔為末湯調下

木防已湯

出本草方

療人膈間肢滿其人喘滿心下痞堅面黧黑其脉沉緊得之數十日吐下即愈

用大防已二兩石膏二枚雞子大碎綿裹桂心二兩人參四兩四味以水六升煮取二升分再服虛者便愈實者三日復發汗至三日復不愈者宜去石膏加芒硝三合以水六升煮三味取二升去滓內芒硝分

再服微下利則愈禁生蔥孫思邈療遺溺小溲澁亦

用三物水防已湯

葶藶散

治上氣喘急遍身浮腫

方見咳嗽門咳嗽不得卧類

四七湯

出直指方

治驚憂氣逆上喘

半夏

製二兩半

茯苓

二兩半

厚朴

製一兩半

紫蘇葉

一兩

右咬咀每服三錢半生薑七片棗二枚煎服

五味子湯

出活人書

治喘促脉浮而厥者

五味子

半兩

人參

麥門冬

杏仁

橘皮

去白

生薑

各二錢半  
棗兒三枚破

右吹咀以水二盞煎至一盞去滓分作二服用之

玉液散

出指南方

治喘

團參 川芎 茯苓 官桂 知母 杏仁 葶

藶 紫胡 半夏各一兩 麻黃 石膏 橘皮 白

朮各一兩 訶子 羌活 秦艽 甘草各半兩

右為麤末每服五錢水二盞薑五片棗一枚煎一盞

去滓溫服

平肺湯

出指南方

天門冬

馬兜鈴

百部

各半兩

右為麤末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

定喘餅子

出衛生寶鑑方

累經神驗

芫花

醋浸一宿炒黃

桑白皮

炒

吳茱萸

炒

陳皮

去白已上各一兩

白牽牛

半生半炒取末二兩

馬兜鈴

一兩

寒食麵

三兩

右件五味先杵為末細入牽牛頭末共麵再拌勻羅

過滴水為丸如櫻桃大捏作餅子取熟灰半碗在罈

內同餅子熱每服一餅嚼爛煎馬兜鈴湯下夜卧服  
之如患人心頭快加上一餅至明微痢下神効婦人  
有胎者不可服

平氣散

出衛生  
寶鑑方

治盛則為喘已未歲初秋三日奉詔

至六盤山至八月中霖雨時承上命治不憐吉吳元  
帥夫人年逾五十身體肥盛因過飲酒及鐘乳腹脹  
喘滿聲聞舍外不得安卧大小便澁滯氣口脉大兩  
倍于人迎關脉沉緩而有力予思霖雨之濕飲食之熱

濕熱大盛上攻于肺神氣躁亂故為喘滿邪氣盛則實實者宜下之故制平氣散以下

白牽牛

二兩半生半炒熟取用頭末

青皮

三錢去白

大黃

七錢

雞心櫚

榔陳皮

半兩三錢去白

內經曰肺若氣上逆急食苦以泄之白牽牛苦寒瀉氣分濕熱上攻為喘故以為君陳皮苦溫體浮理其肺氣青皮苦辛散肺中滯氣為臣櫚榔辛溫性沉重下痰降氣大黃苦寒瀉滯滿實故以為使

右為末每服三錢煎生薑湯一大盞調下無時一服減半再服喘愈止有胸膈不利煩熱口乾時時咳嗽以加減瀉白散主之

加減瀉白散

出衛生寶鑑方

桑白皮

一兩

地骨皮

五錢

知母

去皮五錢

青皮

去白二錢

陳皮

三錢

細黃芩

三錢

桔梗

五錢

甘草

炙三錢

右件剉如麻豆每服五秤水二大盞煎至一盞去滓食後溫服數服良愈華陀云盛則為喘減則為枯活



人書云發喘者氣有餘也凡看文字須要會得本意  
盛而為喘者非肺氣盛也喘為氣有餘者亦非肺氣  
有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認作促肺氣果盛  
又為有餘當清肅下行而不喘以其火入于肺衰而  
不足為喘焉故言盛非言肺氣盛也言肺氣中之火  
盛也言有餘者非言肺氣有餘也言肺中火有餘也  
故瀉肺以苦寒之劑非瀉肺中之火實補肺氣用者  
不可不知

蘇子降氣湯

出如宜方

治喘虛陽上攻喘促

當歸 甘草

厚朴

製

前胡

各二兩

陳皮

製

桂

各二兩

蘇子

半夏

各五兩

右㕮咀薑棗煎

杏仁膏

治氣喘促浮腫小便澀

右用杏仁一兩去皮尖熬研和米煮粥極熱空心喫

二合

人參散

若猶覺停滯在心胃膈中不利者

方見咳嗽門咳嗽上

氣唾膿

血類

獨聖散

又名必効散

得効定喘

右用訶子大者為末每服一錢糯米飲調下

治卒上氣喘息鳴息便欲絕

用人參末服之日五六服

治喘殊妙

右用露蜂房一枚須取似盞大者燒灰存性入白丁香七粒即雄雀糞每服一錢半濃煎人參湯調下立

止不拘時候

喘嗽

論

夫五臟者皆稟于肺若肺氣虛為風冷所乘使經絡否  
溢氣不宜通則肺壅脹則氣逆則心胸滿塞故令咳嗽  
喘急也夫肺為五臟六腑之華蓋主行氣于皮毛形寒  
飲冷則傷于肺肺一受邪安能統攝諸氣氣亂胸中而  
疾生焉重則為喘輕則為嗽喘之為病由痰實而氣不

散上激咽喉哮呷作聲咯不出嚥不下憧憧而急渴渴而數張口擡肩搖身輒肚嗽之為疾病由氣急而痰隨上浮風生喉齧淫淫如痒習習如硬涕唾稠濃聲音重濁甚則續續不已坐卧不安諸方定喘嗽皆以三物拘湯為主麻黃散冷杏仁下氣甘草和中故也九寶湯一方子中皆增六品深有理焉本草云麻黃久服令人虛患喘人無時而發此方中有肉桂實表不致亡陽薄荷桑皮清利膈道紫蘇陳皮大腹寬和氣宇造化精深政如

千金方小續命湯用麻黃佐肉桂云久服不令人虛亦此意也

方

神効散 治老幼喘嗽神効

杏仁

去皮尖炒  
一兩半

甘草

炙

旋覆花

各三兩

白朮

蓮肉

去皮 射干

米泔浸

前胡

御米

畧炒

百合

水浸  
去沫

白扁豆

畧炒 川芎

各三兩

人參

白茯苓

各四兩

神麴

炒五兩

桑白

皮炒 乾葛

桔梗

各六兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一個煎至

七分食後溫服

知母茯苓湯

出醫方大成

治肺痿喘嗽舌塞往來寒熱自

汗

方在肺臟門肺痿類

調降湯

出直指方

治喘嗽

枳殼

製一兩

半夏

製

北梗

青皮

陳皮

真蘇子

檳榔

茯苓

葶藶

隔紙炒各半兩

木香

白豆蔻仁

縮砂仁

紫蘇葉

各二錢半

甘草

炙三分

右劉散每服三錢薑五片食前服

神應丹

出御藥院方

治諸遠年喘嗽

麻黃

一十斤走水洗淨去土爛搗用河水四担浸一宿砂鍋熬至二担去滓

桔萸大

一个皂角

二定去皮經并子

貝母

炒去心

桑白皮

去土

紫蘇子

款冬花

桔梗

知母

各二兩已上八味搗爛入前麻黃汁內熬至一半去

滓澄取清汁再熬成稠膏

白茯苓

去皮

阿膠

碎炒為末秤入藥拌勻各二兩

紫

苑

洗去土

天麻

人參

去蘆三味為末各一兩

右件十四味以藥末搜和前膏杵熟為丸如小彈大



每服一丸溫薑汁化開臨卧飲之便去枕仰卧不許  
久坐如不得睡乃藥之効也此治嗽較慢如治喘不  
以新久如神服此藥三服後似見痢一般

平肺湯

出簡易方

治肺氣上壅喘嗽痰實寒熱往來咽乾

口燥

陳皮

一兩半

洗七次

苦梗

炒

薄荷

各七錢

紫蘇

烏梅

去核紫苑

知母

桑白皮

蜜炒

杏仁

炒

五味子

罌

粟穀

蜜炒各七錢半

甘草

炙半兩

右為粗末每服三錢生薑三片水煎六分食後溫服

加味白朮散

出危氏方

陳皮 半夏 人參 白茯苓 白朮 甘草

炙

山藥

地各二兩

白扁豆

製一兩半

縮砂

桔梗

炒

石蓮肉

薏苡仁

各一兩

右劉散治喘嗽每遇飲酒必發生薑桑白皮煎服効

杏蘇飲

出直指方

治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉

二兩

五味子

大腹皮

烏梅肉

杏仁

去皮

尖各一兩半  
陳皮  
北梗  
麻黃去節  
桑白皮炒  
阿膠炒各

三紫苑  
甘草炒各一兩

右吹咀每服三錢薑五片煎服

參蘇半夏湯出御藥院方  
治咳嗽痰涎咽膈不利喘滿氣

不宣通

人參  
桂去粗皮  
甘草炙  
木香各一兩  
五味子  
桑白

皮炒  
陳皮去白  
白朮  
紫蘇葉  
半夏薑製各二兩

右為末每服五錢水一大盞半生薑十片煎至八分

去滓食後溫服

定肺湯

出直指方

治上氣喘嗽

紫菀茸

北五味子

橘紅

杏仁

去皮尖畧炒

真蘇

子

炒桑白皮

炒半夏

枳殼

製各等分

右為末每服三錢薑五片紫蘇五葉食後煎服

八仙丸

治喘嗽神効

療

三个去核紙裹巴豆慢火燒烟盡

天南星

炮一兩

半夏

洗

小皂角

炙黃去皮子

甘草

炒

款冬花

白礬

枯各半兩

巴豆

七

杏仁

三十五个

去皮尖炒

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二三十九溫  
菜蘆汁下喘嗽細嚼燒蘿蔔栗子生薑湯下

五靈蟬退丸

出本方

治年久近日喘嗽

蟬退

一兩去頭足

五靈脂

半兩生用

砒

半兩生用

雄黃

生

杏仁

去皮

尖各半兩

輕粉

一兩淡豆豉

四十粒

馬兜鈴

一兩生

右件除輕粉研為末用生薑葶藶自然汁合粉藥丸  
如龍眼大每服一丸臨卧細嚼生薑湯送下忌毒

人參蛤蚧散

出濟生拔萃方

治三二十年間肺氣上喘嗽咯

唾膿血滿面生瘡徧身黃腫悉皆治之亦治肺痿咳

嗽及肺壅咽燥

蛤蚧

一對全者以河水浸五宿逐日換水淨浸去腥氣酥炙香熟

甘草

炒

杏仁

炒去皮尖各五兩

人參

茯苓

貝母

桑白皮

知母

各二兩

右為細末淨磁盒子內盛每日如茶點服一料永除神効一方有生薑二斤煎服

青金丹 治涎喘嗽胸脇刺痛久積痰飲痞塞噎悶

五靈脂

豆豉

各半兩

生杏仁

生半夏

各四

生巴

豆二  
个生白礬

各一錢半

青黛為衣

右為細末蜜煉為丸如豌豆大每服一九菜葉裏溫  
薑汁送下食後臨服以青黛為衣

款花貝母散

治喘嗽虛弱病

款冬花

人參

半夏

美製

知母

貝母

甜葶藶

炒御米殼

蜜炒

烏梅肉

已上各等分

右為末每服一錢水一盞生薑五片煎至七分食後

溫服

平肺湯 治肺與腎皆以至陰積水喘嘈咳嗽葢水乘

之

葶藶微炒桑白皮炒北梗枳殼製紫蘇葉半

夏製各一兩麻黃去節三分甘草炒半兩

右剉散每服三錢薑五片煎服腎水用青木香丸

紫蘇半夏湯

出御藥院方

治喘痰涎寒熱往來



紫蘇葉 半夏湯洗七次 紫菀茸 五味子 陳皮各半

兩 桑白皮

炙一兩半

杏仁

去皮尖麤炒黃色一兩

右為粗末每服三錢水二盞生薑七片煎至一盞去滓取六分清汁食後臨卧熱服日進三次

神應丹

出宣明論

治涎嗽喘滿上攻心腹卒痛及痢下血

兼婦人帶下病一切脇肋痛滿

薄荷葉

四錢

甘草

四錢

巴豆

去皮燈燒存性用

五靈脂

盆硝

各二錢

輕粉

一錢

豆豉

一兩慢火炒

右研勻鍊蜜為丸如梧桐子大食後溫薑汁一椀  
許化下一丸續後空嚥津三五次禁飲食少時須覺  
咽喉微熱即効或飲子過多送藥在胃中即効少以  
引子少炒或咽喉過熱即少少吸冷水解之如止心  
腹急痛熱酒或熱醋少許化下兩丸無時未効再服  
得利尤良或利後痛未止者每服一丸以為度止痢  
溫米飲下兩丸食前日進三服治帶下溫酒下兩丸  
或大便利後每服一丸

理肺散 治喘嗽脇肋刺痛不得眠睡

杏仁

去皮尖炒

馬兜鈴

炒

漢防已

茯苓

陳皮

桔

梗

各一兩

葶藶

一分

右為末每服三錢水一盞半生薑五片煎至七分和

滓食後溫服

沉香散

出傳信適用方

定喘治嗽

好沉香

半兩

阿膠

半兩

蛤粉炒成珠子

結實人參

一兩

桑白皮

一揀

兩微炒氣虛人減半

陳皮

半兩

紫蘇

半兩

甘草

一分

右為細末每服二錢生薑三片水一大盞煎至七分去滓通口服元方只以棗湯調下

硃砂丸

出楊氏家藏方

治老人小兒喘嗽咯痰等症晝夜不得眠

輕粉

雄黃

另研各二錢

桑白皮

半夏

薑製

欒金

甜

葶藶

隔紙炒各三錢

右為細末麴糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服六七丸食後睡時生薑湯下病大者三十丸

賺氣散

出御藥院方

治新久喘嗽不已

御米殼

用鹽豉一兩沸湯浸一時許取浸御米殼一宿再用蜜水拌勻炒

人參

各一

兩半杏仁

湯浸去皮尖麩炒一兩

烏梅肉

三錢甘草

炒桔梗

各二兩半

右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓稍熱服不

拘時

安肺散 治涎喘嗽日夜不止

款冬花

五味子

烏梅肉

焙微黃

紫苑茸

各一兩

甘

草

炒半兩

御米殼

去蒂蜜炒四兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後溫服日進二服癆嗽加人參二錢

人參款冬花散

出濟生拔萃方

治喘嗽久不已者咳謂無痰

而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也咳嗽謂有痰有聲也

人參

款冬花

各半兩

知母

貝母

半夏

各三錢

御

米穀

二兩炒黃也

右為粗末每服五錢烏梅同煎臨卧服之

人參理肺散

出醫方大成

治喘嗽不止

麻黃

一兩炒去節

御米殼

三錢炒

人參

炒二兩

當歸

木香

各一兩

杏仁

二兩麴炒

右為粗末每服四錢水煎服之

玉液方

出危氏方

治久近喘嗽口乾作渴

苽萋根

一兩

知母

去心炒一兩

甘草

炙半兩

人參

半兩

右為末每服二錢先銍下黃蠟二錢同入米飲調下

食後服

阿膠散

出傳信  
通用方

治一切咳嗽定喘補肺化痰

阿膠

一兩  
炒

紫團參

一兩

半夏

湯洗七遍同生薑  
搜作餅子一兩

鱉甲

括洗淨醋  
煮黃半兩

甘草

半兩  
剉

右為細末每服二錢水一盞薑二片煎至七分通口

服如癆盛加薑白二寸同煎熱先嚼薑次呷藥

人參針頭丸 專治風飲喘嗽

巴豆

五个  
去皮

半夏

五个研湯  
洗七次

杏仁

五个去  
皮尖

草麻

五个  
去皮

白礬

二錢



右為細末棗肉為丸針簽藥于燈焰上燎過青煙起  
吹息藥蘢菜葉裏之漿水送下臨卧服之

訶子散

海上名方

治喘嗽

漢防已

一兩

麻黃

去根節

訶子

炮

杏仁

麩炒去皮尖各半兩

右為粗末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓入好

茶一錢再煎至七分食後溫服

知母丸

治一切遠年上氣喘嗽

方見咳嗽門咳嗽不得卧類

右剉散生薑三片煎食後臨卧服之

清膈散

出危氏方

治喘嗽吐唾不利膈熱口中苦氣

南星

一兩

鉛白霜

少許

桑白皮

一兩

白附子

五錢

右剉為散生薑三片煎食後臨卧服之

安神散

出宣明論

治遠年近日咳嗽不已

御米殼

蜜炒

陳皮

去白

人參

甘草

炙各一兩

右為末每服一錢烏梅湯下臨卧服之

百部散

百部

款冬花

麻黃

去根節

杏仁

去皮尖炒

各一兩

右為末入杏仁勻每服二錢水一盞半糯米二十粒  
同煎米軟食後溫服

馬兜鈴散 治喘嗽咯膿涎

馬兜鈴

炒

甘草

炒

百部

杏仁

去皮尖炒  
熟各一兩

右為末每服三錢水一盞半煎至七分去滓食後溫  
服

白雲換肺丸 專治遠年近日喘嗽不止

款冬花

一兩

半夏

明礬

寒水石

各二兩

右為細末生薑汁糊為丸如梧桐子大每服三四十

丸薑湯下

黑神丹

一名青金丹

治氣喘咳嗽

方見咳嗽門五臟諸咳嗽類

天南星散

出本事方

治氣喘咳嗽

天南星

大者二個

蚌粉

甘草

各等分

右為末每服一錢水一盞薑三片煎至七分臨卧溫

服

防已丸

出宣明論

治肺不足喘嗽久不已者調理血氣清

消化痰涎

防已 木香

各二錢 杏仁 三錢

右為末鍊蜜和丸如小豆大每服二十丸煎桑白皮湯下如大便利加葶藶一兩食後服之

馬兜鈴湯 治喘嗽咽燥煩渴咳膿血腥臭

桔梗

三兩

甘草

炒一兩

馬兜鈴

二兩炒

右為末每服五錢水二盞糯米一合同煎至七分去滓溫服浮腫者加茯苓白朮各半兩

馬兜鈴散

出肘後方

治肺氣喘嗽

馬兜鈴

二兩只用裏面子去殼

酥

半兩入碗內拌和勻慢火炒乾

甘草

兩

右為末每服一錢水一盞煎至六分溫呷或以藥末

含嚥津亦得

大黃葶藶丸

出本事方

治氣喘咳嗽

大黃

半兩炒

葶藶子

一兩洗淨瓦上炒

右為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服五七丸桑白皮

湯下

又方

出本  
事方

草烏

五錢  
重

麻黃

三錢  
重

右為末每服三大錢蘿蔔一個同煮令熟只喫蘿蔔

妙

殭蠶湯

出瑞  
竹堂

治嗽喘喉中如鋸不能睡卧

好茶末

一兩

白殭蠶

一兩

右為細末放碗內用盞盞定傾沸湯一小盞臨卧再

添湯點服

治諸般嗽喘

出傳信  
適用方

罌粟殼

十个大者用新瓦一片  
細拍碎于瓦上炒黃

大白梅

五个湯浸  
三五次去

鹽  
味

右件用生薑五片棗二個水二盞煎至一盞去滓臨  
卧服留滓天明再煎服之

治大人小兒喘嗽齁齕

出經驗  
良方

右用糯米泔少許磨茶子滴入鼻中令吸入口服之  
口橫咬竹管片時則口間與鼻中涎出如線當日即



愈不過三二次絕其根源屢試驗

治遠年近日喘嗽

出本  
事方

右用皂角不蛀者三大莖一味刮去黑皮刀切開去  
子每子倉內入巴豆肉一粒合就麻皮縛定用生薑  
自然汁和蜜塗令匝慢火炙又塗又炙以焦黃為度  
擘開去巴豆不用以好明礬一兩枯過草麻七個薑  
汁和蜜塗炙前三味為末却以杏仁二兩去皮尖研  
成膏却與前藥和勻每服一錢用柿子乾炙過候冷

點藥細嚼臨卧服忌熱毒魚鮓鮭鯊油麴酒米醋煎  
燂熱毒等物

神効散

一名神効湯  
出危氏方

治一切喘嗽

右用不蛀大皂角一條作兩邊去子每孔入巴豆肉  
一粒線繫定童子小便浸一宿火炙令焦黃去巴豆  
不用或入一二粒亦不妨却以杏仁半夏各一合入  
麻油內煎令拆裂為度同為細末每服一字乾柿點  
藥細嚼或用白糖點喫亦可臨卧時服服了不可喫

湯水一應物妙不可言

蛤蚧膏

出御藥院方

治遠年近日咳嗽上氣喘滿如神

蛤蚧

一對用雌雄各半兩米泔刷洗淨二十遍酥炙黃色

潞參

一兩半末

紫菀茸

麻黃

一斤去根節

艾葉

槐角

二味炒

陳皮

枇杷葉

去毛

桑白皮

甜葶藶

款冬花

杏仁

去皮尖

薄荷葉

佛耳草

五味子

紫蘇葉

皂角

去皮子

貝母

各半

兩

右件除蛤蚧潞參外取十六味搗羅為粗末用河水

三斗於鍋內慢火熬至一斗半搓揉勻濾去滓令極細再用生絹袋濾過以文武火再熬成膏然後入蛤蚧潞參細末與膏和勻丸如彈子大每服一九任意湯磨下食後臨卧服之

馬兜鈴散

出聖惠方

治咳嗽喘急面目四肢浮腫

馬兜鈴

一人

兩去蘆頭

貝母

一兩煨微黃

甘草

一兩炙微赤色

甜葶藶

一兩隔紙炒紫色

杏仁

一兩去皮尖雙仁炒微黃

麻黃

一兩去根節

知母

一兩

皂莢

一兩去黑皮酥炙黃去子

五靈脂

一兩

葶藶

一兩

白皮

一兩

款冬花

一兩

陳橘皮

一兩

湯浸  
去白穢

黃明膠

二兩

搗碎

炒令  
黃

右為散每服五錢以淡漿水一中盞煎至六分去滓

溫服不拘時

天門冬丸

一名調肺丸

出御藥院方

治肺臟客熱喘促咳嗽心神

治肺臟客熱喘促咳嗽心神

煩悶

方在肺臟門

肺臟壅熱類

紫菀散

出聖惠方

治咳嗽喘急咽喉不利胸中似物妨塞

紫菀

一兩

去  
苗土

桑白皮

一兩

剉

款冬花

半兩

葶藶散

半兩

紫菀

胡

三分  
去苗

桔梗

一兩去  
蘆頭

甘草

半兩炙  
微赤剉

赤茯苓

一兩  
川升

麻

三分  
射干

兩枳殼

一兩麩  
炒去穰

右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去

滓不計時溫服

百部丸

出和  
濟方

治肺氣不調咳嗽喘急胸膈煩悶唇乾

口燥面目浮腫咽嗑不利積久不瘥咯唾膿血者亦

宜服之

方見咳嗽  
門熱嗽類

人參清肺湯

治肺胃虛寒咳嗽喘急坐卧不安胸膈

噎悶脇肋脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽噎引痛及療  
肺痿癆嗽唾血腥臭乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦  
倦怠減食

地骨皮 人參 甘草 阿膠麩炒 杏仁去皮尖麩炒 桑

白皮 知母 烏梅去核 罌粟殼去蒂蓋 桔梗去蘆

右等分為散每服三錢水一盞半烏梅棗兒各一枚  
同煎至一盞去滓食後臨卧加蜜半匙攪勻澄清吸  
服効一方無桔梗

紫蘇子煎 治咳嗽喘急形體虛羸不思飲食

紫蘇子

五合 微炒

生地黄汁

一升

麥門冬

五合

白前

一兩

生薑

汁 貝母

二兩 煨 微黃

人參

一兩 去蘆

白蜜

一升

杏仁

五兩 湯浸去皮

尖雙仁 麩炒 黃研如膏

紫苑

二兩 去苗土

五味子

一兩

右六味為末以諸藥入杏膏等同于銀鍋中攪勻以慢火煎成膏于不津器中盛不計時候服一茶匙含

化嚙下津

桑白皮湯 治咳嗽胸滿氣急



桑根白皮

剉

紫蘇

連莖葉

知母

焙

貝母

去心焙

款冬花

去梗半夏

湯浸七遍焙乾

五味子

各一兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙

甘草

炙人參

各半兩

右搗篩每服三錢水一盞薑三片同煎至七分去滓

日三服溫服

紫菀湯 治咳嗽喘急胸腹脇肋脹悶痛疼

紫菀

去苗土

桔梗

剉

款冬花

去梗枳殼

麩炒去根各一兩

陳皮

去白焙赤茯苓

半兩

赤芍藥

百合

各一兩半

大腹子

二枚  
劉

右檮師每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服  
日進三服

人參紫菀湯 治肺氣不調咳嗽喘急胸膈煩悶痰涎  
不利坐卧不安晝夜不止久不愈者以致形容瘦減  
力氣羸劣者並宜服之蘇司法再三禱之于滕舉二  
方

人參 五味子 甘草 桂枝 各一分 京紫菀 款

冬花

杏仁

各半兩

縮砂仁

罌粟殼

去頂穢用薑汁炒各一兩

葶藶散

治痰嗽喘急

葶藶

半兩

半夏

半兩薑汁浸軟切片

巴豆

四十九粒去殼同上二味一處炒炒至半

夏黃色為度去

巴豆不用之

右以前二味為細末每服一錢用薑汁蜜同調食前

嚥下

人參散 治諸咳嗽喘急語言不出年久者四五服日

近者三四服

加減三奇散

治咳嗽上氣痰涎喘促胸膈不利

方見咳嗽

門 在前咳  
嗽上氣類

人參

知母

貝母

半夏

杏仁

生用

馬兜鈴

十個

麻黃

不去節  
各半兩

天僊藤

二兩

右為粗末每服三錢用烏梅一箇水二盞蜜一匙煎

至八分去滓食後溫服忌酒醋雞麪鹹酸生冷等物

人參定喘湯

治丈夫婦人遠年近日肺氣咳嗽氣急

喉中涎聲胃滿昏沉氣逆坐卧不安飲食不下及治

肺感寒邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

人參

切

麻黃

去節

甘草

炙

阿膠

炒

半夏

麴

各一兩

桑白

皮

五味子

各一兩

罌粟殼

蜜刷炙

二兩

右為粗末入人參片拌勻每服三錢水一盞半入生

薑三片煎至七分去滓食後溫服又治小兒久病肺

氣喘急喉中涎聲胸膈不利嘔吐痰沫更量歲數加

減服之一方無桑白皮

辰砂利膈丸

治胸膈痞滿痰飲氣滯上焦窒塞肺氣

不利咳嗽喘滿嘔吐痰涎咽嗑不利風熱相搏頭目昏痛精神困倦並皆治之

天南星

炮

白茯苓

乾生薑

生犀

各二兩

半夏

半斤

白礬

半生半枯

乾山藥

各三兩

皂角

一斤去皮子經水三升熬成膏

右為細末用皂角膏子和丸如梧桐子大硃砂為衣每服六十丸至七十丸食後生薑湯下

細辛五味湯

一名小青龍湯

治肺氣不利咳嗽喘急胸膈煩

悶痰涎多喉中有聲鼻塞清涕頭痛目眩肢體倦

急咽嗌不利嘔逆惡心

方見咳嗽門喘嗽不得卧類

人參潤肺湯

治肺氣迫促喘急咳嗽不已并傷寒頭

疼憎寒壯熱四肢疼痛

人參

桔梗

白芷

麻黃

去節

乾葛

白朮

甘

草

各一兩

白薑

半兩

右為末每服二錢生薑三片葱白二寸水一盞煎至

八分如出汗連進二服通口溫服

馬兜鈴散

治咳嗽喘急胸膈煩悶

馬兜鈴

一兩

桑白皮

剉一兩

川升麻

半兩

燈心

三兩

甘草

三分

炙微

赤剉枳殼

一兩麩炒黃去穰

右為散每服五錢水一盞生薑半分煎至五分去滓

溫服

杏仁丸

治咳嗽喘急腹肋堅脹小便不利

杏仁

三兩湯浸去皮尖雙仁炒研如膏

桂心

一兩

馬兜鈴

一兩

枳殼

一兩

麩炒

瞿麥穗

一兩

甜葶藶

一兩隔紙炒紫包

木通

剉一兩

大腹

皮

剉一兩



右為末以杏仁膏入少許鍊蜜同和丸如梧桐子大  
每服三十丸不計時候煎棗湯下

養肺丸 治脾胃呼吸風冷咳嗽上氣喘急語聲不出  
喉中似噎

人參

去蘆頭  
取淨

官桂

去粗  
皮

甘草

炒

五味子

乾薑

紫苑

去土  
取淨

細辛

去苗葉  
各一兩

右為細末鍊蜜和丸每兩作二十丸每服一丸綿子  
裏口內含化隨津液下之食後服

麻黃散 治男婦久近肺氣咳嗽喘急上冲坐卧不安

痰涎壅塞咳唾稠粘手脚冷痺心脇疼脹兼傷風咳

嗽膈上不快

訶子皮

去核

款冬花

去梗格

甘草

各五兩

麻黃

去根節

肉

桂

六兩去皮不見火

杏仁

去皮尖麤炒三兩

右為末每服二錢水一盞入好茶一錢同煎八分食

後夜卧通口服之如夜半不能煎但以藥末入茶和

勻沸湯點或乾嚥亦得忌魚酒炙煨猪肉腥燥物

紫團參丸 治肺氣有餘咳嗽喘急胸脇痞痛短氣噎

悶下焦不利腿膝微腫

潞州人參

二錢半

蛤蚧

一對酥炙黃

白牽牛

苦葶藶

一兩

微炒木香

甜葶藶

微炒上二味各半兩

右為末用熟棗肉為丸如梧桐子大每服四十九食後煎人參桑白皮湯送下

白朮湯 治五臟受濕咳嗽痰多上氣喘急身體痛腫脉來濡細

白朮

二兩

五味子

半夏

湯洗七次

白茯苓

去皮

橘紅

各一兩

甘草

炙半兩

人參

桑白皮

各半兩

右為咬咀每服四錢水盞半生薑五片煎至八分去

滓溫服不拘時候此方比三因多橘紅

定喘丹

治男女久患咳嗽肺氣喘促倚息不得睡卧齁

齁嗽亦宜服之累年不瘥漸致面目虛浮

杏仁

去皮尖炒別研

馬兜鈴

蟬蛻

洗去土并足翅各一兩

煨礞石

二錢

別研

右為末蒸棗肉為丸如葵子大每服六七丸臨卧苦  
茶清于冷送下忌熟物半日一名定喘瑞應丹

漢椒丸 治咳嗽喘急坐卧不得宜服

漢椒

一兩去目及閉口者炒出汗

猪牙皂角

一兩去黑皮酥炙黃去子

乾薑

三分

甜葶藶

三分紙隔炮剉炒熱色

右為末用棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸不拘  
時以桑白皮湯送下

三拗湯 治寒燠不常人多暴嗽咽痛聲啞鼻塞痰稠

喘急

麻黃

不去節

杏仁

不去皮尖

甘草

不炙各二兩

右以咀每服三錢薑五片煎七分去滓無時服有汗

即愈

團參散 治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參

款冬花

紫菀茸

已上各等分兩

右為末每服二錢水一盞烏梅一個煎至七分去滓

食後溫服

寧肺湯 治咳嗽喘急不問久新悉皆療治

罌房

半兩去枝梗  
剉蜜炒黃色

五味子

去枝梗  
半兩

烏梅

去核  
四兩

右為粗散每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去

滓食後溫服

玉津丸 治久年喘急咳嗽欲死者

雄黃 雌黃 硫黃

信砒

各一錢

南星

七錢

右為末薑汁調攤盤內大皂角七八條燒烟覆盤其上  
盤極熱烟盡冷取出丸如梧桐子大大人一服四

丸小兒一服一二丸含薑片津滿口去薑以津下藥  
訖便睡神効

甜葶藶散 治咳嗽喘急方

甜葶藶

一兩隔紙炒紫色

桑根白皮

一兩剉

右為散每服二錢水一中盞入燈心一束大棗五枚  
煎至六分去滓食後調下

人參方

一名人參散  
出肘後方

治咳嗽上氣喘急嗽血吐血宜

服此藥



右以人參好者搗為末每服三錢雞子清調之五更  
初服便睡去枕仰卧只一服愈年深者再服忌腥鹹  
鮮醬麪等并勿過醉飽將息

導痰丸

出經驗良方

治痰飲氣滯胸膈不利喘咳氣促脇

肋滿脹咳嗽多痰鼻塞稠涕氣不升降胸膈痞結並  
宜服之

天南星

大半夏

各不剉

白明礬

生薑

各半斤洗淨切作片

猪牙皂角

四兩剉碎

皂角

四兩無虫蛀去皮尖剉碎

已上六味一處用瓦罐以水浸過為度煮乾令透去  
白礬生薑皂角止取南星半夏劉煕同後藥同研為  
末

真紫蘇子

蘿蔔子

麥蘖

各四兩  
並炒

糖毬子

四兩  
去核

即山果子又名候楂此藥名  
楊氏家藏方橘核散內見

右為末麵糊為丸每服五六十丸淡薑湯下不拘時

候服

祛痰丸

出瑞  
竹堂

治風痰喘嗽

人參 木香 天麻 白朮煨 茯苓 青皮去穢 陳

皮

去白以上  
各一兩

槐角子

半夏

各七錢半

猪牙皂角

去皮  
經酥

分  
炙五

右為末生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大每服五  
七十丸食後臨卧溫酒送下薑湯亦可

人參半夏丸

出宣  
明論

治一切痰飲喘嗽不已

白礬

天南星

半夏

各半兩

甘草

二錢半炙

人參

二錢赤

小豆

四十粒

杏仁

四十粒炒

猪牙皂角

一錢

右為末秫子三合醋一升熬粥和丸如梧桐子大每服十五丸炒蘿蔔子湯臨卧送下

神御散

出百一選方

治痰盛喘乏咳嗽不已

御米殼

出頂蒂蜜炙細剉四兩

款冬花去枝佛耳草

甘草炙

人參

陳皮

去白

阿膠

蛤粉炒

杏仁

去皮尖雙仁麤炒各一兩

右為末每服五錢水一盞半生薑三片肥烏梅一箇

拍碎煎至七分去滓溫服不拘時臨卧服尤妙

安神散 治痰涎喘嗽久不愈

款冬花

佛耳草

各三錢

鍾乳石

白礬

甘草

各生

一分

右為末每服二錢水一盞入蠟少許煎至七分和滓  
溫服食後每日二錢

郁李仁丸

治水氣乘肺動痰作喘身體微腫

方見咳嗽門

嗽面目  
浮腫類

辰砂半夏丸

治大人小兒肺壅痰實咳嗽喘急胸膈

痞滿心忪煩悶痰涎不利呀呷有聲

半夏湯地 葶藶研 杏仁去皮尖別研 五靈脂 硃砂別研

各一兩

右將五靈脂半夏為細末却入杏仁葶藶硃砂末攪勻生薑汁打糊為丸如梧桐子大每服二十丸食後蘿蔔湯下

葶藶散

出宣明論

治肺氣喘滿痰嗽睡卧不安不思飲食

苦葶藶 蛤蚧粉各三錢 桑白皮 山梔子 人參

各五分 荆介穗 薄荷葉 赤茯苓 桔梗 杏仁

去皮 甘草 已上各  
半兩

右為末每服三錢水一大盞生薑三片煎至六分去

滓食後溫服

參蘇溫肺湯 治形寒飲冷傷肺喘嗽煩心胸滿氣不

得動暢

人參 紫蘇葉 甘草 各五錢 肉桂 五味子 木

香 各四兩 陳皮 白朮 各六錢 半夏 各半兩 白茯苓 去皮各半兩

桑白皮 一兩

右為麤末每服五錢水一盞半生薑三片煎至八分  
去滓大溫服食後如冬寒每服中加不去節麻黃半  
錢先洗去沫下諸藥

九寶湯

出澹  
案方

治老人小兒婦人室女素有喘疾過寒  
暄不常發則連綿不已喘嗽哮吼夜不得睡

麻黃

薄荷

陳皮

各一兩

官桂

紫蘇

杏仁

去皮

尖

桑白皮

甘草

大腹子

連皮各  
半兩

右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片烏梅半箇煎



至六分去滓專心服餌其効甚著或入童子小便尤佳感冒鼻流清涕亦効病各有主對不可疑其發散耗氣之說惟虛勞自汗不當用之一方罌粟殼二箇去頂人參少許

救生丹 治大人小兒喘咳嗽其効如神

號丹 馬牙硝

人言

各一錢細研一夜露七宿用

甜葶藶

紙隔

炒桑白皮

半兩

杏仁

去皮尖半兩

雞脆胗

十個

右為細末同煎三味和勻棗肉為丸如梧桐子大每

服七丸臨卧清茶下

紅椒丸

出危氏方

治虛勞喘嗽眩暈

靈砂

一兩細研

人參

木香

大香附子

并淨

大紅椒

去合

口并子焙出汗各半兩

右為末糕糊丸如麻子大每服二十丸空心橘皮湯

下

胡椒半夏丸

治虛寒喘嗽冷痰不止

半夏

乾薑

各一兩

胡椒

丁香

各一分

右為細末生薑自然汁煮薄糊為丸如梧桐子大每服三十丸細嚼乾柿湯食後送下

鍾乳丸

出危氏方

治喘嗽痰涎稠粘晝夜不止不得坐卧

遠年近日並皆治之

滑石半兩鍾乳粉

見成者一兩

南星

炮切片生薑製

右為末煮乾柿去蒂核搗細搜藥為丸如梧桐子大每服四十丸薑棗煎湯下氣弱人更服養正丹

百花膏

出濟生方

治喘嗽不已或痰中有血

款冬花 百合

蒸培

右等分為細末鍊蜜為丸如龍眼大每服一丸食後  
臨卧細嚼薑湯嚥下噲化尤佳

杏仁煎

出濟生方

治久患肺喘咳嗽不得已睡卧不得服

之即愈

杏仁

去皮尖

胡桃肉

右等分為細末研成膏鍊蜜少許丸如彈子大每服  
一丸或二丸食後臨卧細嚼用薑湯嚥下人參湯亦

可生薑煎服亦可

寧神散

一名寧肺散方見咳嗽門五臟諸咳嗽類

雌黃丸

出聖惠方

治咳嗽喘急

雌黃

分一雄黃

分一杏仁

七枚湯浸去皮尖雙仁炒微黃色

右為末以蟾酥為丸如粟米大以燈心煎湯每服三

五丸送下

治喘嗽上氣

華陀中藏經方

蒲葯葉治一切肺喘劇甚者効如神焙碾為末米飲

調服二錢匕併服取瘥氣味清香其實酸澁夏紅可  
食核如棗核類山茱萸揀葉背白者用江西謂之盧  
都子

七七散

余居士  
選奇方

治喘嗽

長皂莢三條去黑皮破開兩邊去子一莢入巴豆十  
粒一莢入半夏十粒一莢入杏仁十枚用生薑汁製  
杏仁麻油製巴豆蜜製半夏右件一處火炙黃色碾  
為細末每服用一字安在手掌中臨睡用生薑汁調

舌點喫立有神効

雄黃丸

余居士選奇方

治喘嗽

雄黃

雌黃

信

各一錢

巴豆

五粒

半夏

半兩湯浸七次

右搗末糊為丸如椒子大每服五丸臨睡茶清下忌熱物小兒加減與服之

四寶丸

出仁存方

治喘嗽化痰

知母

貝母

款冬花

白礬

枯

右等分為末以稀糊丸如梧桐子大甑上蒸過每服

二十丸食後薑湯送下

千金丸

出仁存方

治證同前

南星

半夏

各一兩

白礬

一兩半枯

右以生瓜萋一個去子入藥在內濕紙裏煨熟取出  
為末再用生白礬一兩將瓜萋穰汁并瓜萋仁研細  
同丸如梧桐子大每服十五丸用淡薑湯下臨卧服  
之

一方

出仁存方

治喘嗽



雄黃 雌黃 信石 黃丹

右等分用鯽魚一箇去腸肚洗淨量魚大小入藥在  
內令滿以線縛定鹹泥固濟用炭三斤燒紅候冷取  
出研細末浸蒸餅為丸菰豆大臨卧沙糖水下三五  
丸小兒一二丸每夜只一服

化痰延壽丸

海岳居士秘方

治痰喘中滿咽喉作聲或中風

偏枯不能行步並宜服之

香附

四兩炒

南星

一兩炮

半夏

四兩漿水浸

枳殼

二兩麩炒去穰

白礬

半兩黑牽牛

頭末四兩  
炒微黃

商陸

一兩

右為細末酒打麵糊為丸如梧桐子大每服五六十丸生薑湯送下食遠臨卧服之嗽加人參一兩喘加

紫參一兩

甜葶藶丸

出聖惠方

治一切喘嗽不瘥

甜葶藶

一兩隔紙  
炒令紫色

人參

三分去  
蘆頭

赤茯苓

三分蛤蚧

一對

頭尾全酥  
炙微黃

杏仁

一兩湯浸去  
皮尖雙仁炒

右為細末以棗肉和丸如梧桐子大每服三十九日

進三四服以粥飲下

控痰良方

出直指方

治喘嗽通用

號丹 白礬

各二兩

右以錢王搏刺一大孔先入號丹以白礬蓋頂用炭一斤煨至火盡礬枯丹黑出火毒研細煮調麪和丸如麻子大每服十五丸沸湯泡生薑汁送下諸頑痰迷塞關竅不通聲音不出以三十丸研末入全蝎少許用自然薑汁下澄取清者調灌須臾吐痰立愈凡

喘促胸膈膨湃寸脉急數須從權吐之中滿內實而喘者與解毒雄黃丸

二黃丸

衛生家寶方

治喘嗽哮呷氣急雌雄

雄黃

三錢

雌黃

三錢

信砒

一錢

馬兜鈴

三錢

杏仁

七粒

去尖

右件研細將皂角五條不蛀者搥碎掇取汁一盞熬

成膏子和藥安乳鉢內燒皂角烟熏過丸如蘿蔔子

大每服三丸臨卧釐水送下小兒一丸孕婦不可服

一夜只一服喘退不可服也

治感冒寒喘嗽久不瘥或身有煩熱其脉弦緊者

方 澹寮

小牝胡湯加桑白皮北五味子薑棗煎服

治喘嗽

右用陳橘皮一兩水浸去穰細切用巴豆十粒去殼  
同橘皮炒令十分赤色傾在桌子上揀去巴豆須淨  
盡不用巴豆擣橘皮為末每服二錢水飲調下臨卧  
時服遠年二三服或瀉一兩行不妨以溫粥補之忌  
食毒物

哮喘

論

夫治哮喘嗽者一名艱艱涎在咽喉間令人喘嗽不寧甚者搖身滾肚上氣喘急頭汗身冷或時發作多由小年冷水驚恐所致也

方

青金丹 治喘

天南星一人 參二錢 半夏一兩 款冬花三錢 杏仁二兩

去皮 螺青半錢 百藥煎二兩 五味子五錢 殭蠶二個 白礬半錢

訶子五錢 皂角一兩

右為細末薑汁糊為丸如梧桐子大每服二十九臨

卧茶清送下忌生冷膩熱之物日三服

黃明膠散出本方 治十六般哮喘

黃明膠一兩炒 馬兜鈴仁 甘草各一兩 半夏薑汁浸三日重

一杏仁去皮尖 人參半兩

右為末每服一大錢水一盞隨病湯使煎至七分臨

卧後服 心嗽面赤或汗流加乾葛煎一方白芷

肝嗽眼中淚加烏梅一箇糯米十四粒煎 脾嗽不

思飲食或惡心入薑三片煎 胃嗽吐通吐酸水

蚌粉煎 肺嗽上氣喘急入桑白皮煎 膽嗽令人

不唾用茶半錢調 膈嗽咳出痰丸塊生薑自然汁

調嚥下 勞嗽入秦艽末同煎 冷嗽天曉時嗽甚

加葱白同煎 血嗽連頓不住當歸生薑一方棗

產後嗽背脾疼痛甘草一寸黃蠟少許煎 黎嗽涕



唾稠黏烏梅生薑煎 氣嗽吐痛脹滿青皮去白煎

熱嗽夜甚蜜一匙葱頭白煎 哮喘聲如拽鋸入

半夏二個煎 腎嗽時復三兩聲入黃耆白糖煎

已上十六件哮喘病依法煎服無不効驗

青金丹

一名定喘  
寧肺丸

治勦嗽

方見咳嗽  
門久嗽類

內金丸

出仁  
存方

治哮喘

雞內金

二十  
一箇

信石

二錢  
半

黃丹

半  
兩

右各研細露星七宿再入白牽牛末半兩葶藶末半

兩半夏二錢半共為末蒸棗肉取膏為丸如麻子大

露星二宿硃砂為衣每服七丸臨卧冷清茶送下

金粟丹

一名雄黃解毒丸  
出經驗良方

雞冠雄黃

研令極細  
各二錢半

巴豆

十四粒去殼  
膜壓令油盡

右為末醋煮麪糊為丸如粟大津唾嚥下或茶清下  
大人十丸小兒量其大小與服見効

治遠年近日哮喘妙方

出本事方

砒一錢麪一錢

海螵蛸一錢

右為末水調作餅子慢火炙黃再研令細每服一字  
用井花水調一大鍾呷空心服良久吐出為度小兒  
加減與之忌食毒物

紫金丹

出本事方

治哮喘

信石

一錢半研

淡豉

一兩水潤去皮研成膏

右以豉丸如菴豆大每服七丸至十丸冷淡茶清下  
臨卧只一服後不可喫一應湯水之類今以信八分  
豉一兩每服二十丸一法二件成膏搽盪內艾熏入

生硃末丸有一夙疾婦人患十年遍求醫者皆不効  
忽有一道人貨此藥漫贖一服是夜減半數服頓愈  
遂多金丐得此方予屢用以救人特為神異

鬼哭丹

一名改破丸  
出經驗良方

治軀軀亦能治瘡

白信石

一錢白砒霜者  
良不用黑者

寒水石

四錢

右各研為細末取端午日三五家粽角極薄切用建  
盞盛粽一過用寒水石鋪一過却信石鋪之如後用  
粽角用前法鋪之如鋪盡仍將粽子蓋却用淡豉冷

水微浸取濃汁滴于盞內用乳搥搗鍊成丸取劑左  
右心盛藥丸如大粟米大每服大人止服五丸五歲  
後止三丸周歲已上止一丸瘥痰未發前五更東流  
水化下 水鹵鹹筍燒灰調沸湯候冷吞下 食鹵  
茶筍燒灰調沸湯冷下或冷蠟茶清下 老鹵用半  
夏五粒生薑一大塊同搗自然汁吞下永遠不  
發

古老飲

出仁  
存方

治魚哮喘嗽

古老錢

白梅肉

各七箇

右水一大盞浸二宿每服一茶脚許空心服良久吐

出惡物

鯽魚丸

出家藏經驗方

治肺經久受邪氣嗽喘急初發則寒

從背起冷如冰雪漸漸喘促氣不相續痰涎壅塞咯吐不出坐卧不得莫可支吾兩肩聳豎曲背弩目困憊欲絕宜服或未効再服即愈其効如神

右用鯽魚重一斤者不去鱗腸只于肚下近頭處開

一孔入信石一塊重一錢令深入在內却以魚入竹筒內外用青蒿搗溼固濟候乾火煨竹筒通紅候冷出溼取魚去燒不過者研細入蚌粉三錢研得所丸如菰豆大硃砂為衣每服四丸或五六丸沙糖冷水下臨卧服之忌熱物一方喘正急時宜服不可多過丸數欲試此藥先用猪肺一枚吹脹入數粒于肺腕內頃刻漸痿方表其効

千金丸 治哮喘

吻藥千兩金丸奇 神仙留與故人知 一兩雄  
黃雞冠色 半兩明信煨如灰 一兩玄精龜背  
樣 雌黃一兩最相宜 一兩蘖管如雪色 二  
兩明霜火上飛 二兩蛤蚧巴豆炒 去了殼兒  
六十枚 同炒去豆只用粉 荷葉乳為極細末  
泡糕調糊莫令稀 丸如菴豆顆兒大 每服  
七丸用冷齏 小兒服時歲加減 喫了忌酒三  
日期 喉如拽鋸聲鳴響 審問莫與藥差池



此藥家傳百餘載 且莫輕傳寶秘之

紅散子 治諸呀呷有聲睡卧不得

右土硃不拘多少極為細末米醋調時時進一二服  
治一切齕齕

右用處州磁器不以多少打碎碾為細末如齕發時  
每用二三錢用手指頭點津液蘸藥點舌上嚥下即  
効

黑馬蹄香散 治哮喘

右用馬蹄香焙乾研為細末每服二三錢如正發時  
用淡醋調不少時刻吐出痰涎為驗

馬屁勃丸

治哮喘

方見咳嗽  
門久嗽類

白前方

出肘  
後方

主久患呀呷咳嗽喉中作聲不得睡卧

右取白前搗為末溫酒調二錢服

治久哮

右用梧桐子一連紙包濕放在火煨取出安地上出  
火氣為末空心井花水一盞送下痰出即愈

治哮喘嗽

右以大南星切作片香油煎至黑色研末睡覺細嚼  
嚥茶清嗽口不語之

治吼喘咳嗽病脾胃寒不思飲食面色黃羸瘦古人名  
為肺脹今人却做胸喉大黃黑白二牽牛等分修合  
成就更加檳榔為末名為奪命因由冷漿調下便時  
休免得胡針亂灸

治齁喘

出朱氏  
集驗方

右用苦丁香三個為末水調細呷吐出稠痰即愈

治鹵肭

永類  
鈴方

白礬

半兩  
煨

天南星

半兩  
炒  
至烟起

巴豆

半錢  
去  
皮油

甘遂

二錢  
半末

右作末和勻每服大人一錢小兒半錢薑片夾嚼燈  
心湯臨卧一服尋常華蓋散打和參蘇飲服婦人九  
寶湯和清肺湯加芎歸煎服

療鹵

出本  
草方

右取榆白皮陰乾後焙杵為末每日朝夜用水五合

末二錢煎至如膠服瘥

治齁齕及吐風涎

右用石莧與甘草同煮服

治喉中呀呷有聲不絕

右以不蛀皂角燒灰存性碾細以生薑自然汁調一錢許于掌中旋旋舌舐之



普濟方卷一百六十三